

## **Errore tipografico nel testo del foglio illustrativo di alcuni lotti di LANTUS 100 unità/ml soluzione iniettabile in flaconcino (AIC 035724121/E)**

L’Agenzia rende noto che l’Azienda Sanofi s.p.a. ha comunicato la presenza di un errore tipografico nel testo del foglio illustrativo di alcuni lotti del prodotto LANTUS 100 unità/ml soluzione iniettabile in flaconcino (AIC 035724121/E).

L’errore è presente nella sezione “IPERGLICEMIA E IPOGLICEMIA” e riguarda, in particolare, l’indicazione della quantità di zucchero che il paziente deve assumere in caso di ipoglicemia.

Nel foglio illustrativo dei lotti **2A5901 - A6990 - 1A6992 - A6992 - 1A6991 - A6991 - A6051 - A6065 - 1A6065** è infatti erroneamente riportato “1020 g” anziché “10-20 g”, come indicato nell’immagine qui di seguito.

### **“IPERGLICEMIA E IPOGLICEMIA”**

#### **Cosa deve fare in caso di ipoglicemia?**

1. Non inietti insulina. Assuma immediatamente 1020 g di zucchero, quale glucosio, cubetti di zucchero o una bevanda dolcificata con zucchero. Attenzione: i dolcificanti artificiali e gli alimenti contenenti dolcificanti artificiali (quali bevande dietetiche) non aiutano a trattare l’ipoglicemia.
2. A questo punto consumi del cibo che possa causare un rilascio di zucchero nel sangue per un lungo periodo di tempo (quali pane o pasta). Il medico o l’infermiere devono discutere precedentemente con lei di tali misure. La normalizzazione dell’ipoglicemia può essere ritardata in quanto Lantus ha una lunga durata d’azione.
3. Se si verifica un’altra ipoglicemia, assumi nuovamente 1020 g di zucchero.
4. Parli con il medico non appena si accorge dell’impossibilità di controllare l’ipoglicemia o nel caso che essa si verifichi di nuovo.

**Da leggersi: 10-20 grammi**

Si conferma che la problematica non coinvolge altri lotti.

Il foglio illustrativo corretto – al momento della dispensazione – verrà reso immediatamente disponibile attraverso il servizio FarmaStampati.