

Schemi terapeutici- Epclusa	
Criterio/ Genotipo	Gts
<b>Criterio 1-11</b>	Sof/Velp 12 SETT ± Riba (*)
	Sof/Velp 24 SETT (**) + Riba



(\*) L'aggiunta di ribavirina deve essere presa in considerazione per i pazienti con cirrosi scompensata (sezione 4.2 Tabella 2 RCP).  
 Inoltre può essere presa in considerazione per i pazienti con infezione da HCV di genotipo 3 con cirrosi compensata (vedere paragrafo 5.1) e per i pazienti precedentemente trattati con un regime contenente NS5A (paragrafo 4.4).  
 Si rimanda alle indicazioni del Riassunto delle caratteristiche del prodotto per quanto riguarda l'aggiustamento della dose di ribavirina in co-somministrazione con Epclusa (sezione 4.2 Tabella 2 RCP).

(\*\*) Il trattamento con Epclusa + RBV per 24 settimane può essere considerato per pazienti nei quali è fallita la terapia con un regime contenente NS5A e che sono ritenuti ad alto rischio di progressione della malattia clinica e che non hanno opzioni di trattamento alternative (RCP paragrafo 4.4).

Il trattamento con **Epclusa + SMV** può essere considerato per pazienti nei quali è fallita la terapia con un regime contenente NS5A e con genotipo virale 1. Nei pazienti con Gt1a, indipendentemente dal grado di fibrosi, e nei pazienti con fibrosi F4 è indicato un regime di 24 settimane.