

SimPR24 (12_12)			
Ordine di inserimento			
RF1	RF1	SETT 1	
RF2		SETT 2	
RIV1 SETT 4		SETT 3	
RF3		SETT 4	
RF4	RF2	SETT 5	RIV1 (<25 UI/ml)
FT con Sim SETT 12		SETT 6	
12 SETT PegIFN + Rib		SETT 7	
Fine terapia SETT 24		SETT 8	
SVR12	RF3	SETT 9	
SVR24		SETT 10	
		SETT 11	
		SETT 12	
	RF4	SETT 13	FT con Sim
		SETT 14	(Non Detectable)
		SETT 15 - 24	
		SETT 25	Fine terapia 24 (12_12)
	PegIFN + Rib	SETT 26	
		SETT 27 - 36	
		SETT 37	SVR12
		SETT 38	
		SETT 39 - 48	
		SETT 49	SVR24
		SETT 50	

SimPR48 (12_36)			
Ordine di inserimento			
RF1	RF1	SETT 1	
RF2		SETT 2	
RIV1 SETT 4		SETT 3	
RF3		SETT 4	
RF4	RF2	SETT 5	RIV1 (<25 UI/ml)
FT con Sim SETT 12		SETT 6	
12 SETT PegIFN + Rib		SETT 7	
RIV2 SETT 24		SETT 8	
24 SETT PegIFN + Rib	RF3	SETT 9	
Fine terapia SETT 48		SETT 10	
SVR12		SETT 11	
SVR24		SETT 12	
	PegIFN + Rib	SETT 13	FT con Sim
		SETT 14	(Non Detectable)
		SETT 15 - 24	
		SETT 25	RIV2
	PegIFN + Rib	SETT 26	(Non Detectable)
		SETT 27 - 48	
		SETT 49	Fine terapia 48 (12_36)
		SETT 50	
		SETT 51 - 60	
		SETT 62	SVR12
		SETT 63	
		SETT 64 - 72	
		SETT 73	SVR24
		SETT 74	

SimSof±R12			
Ordine di inserimento			
RF1	RF1	SETT 1	
RF2		SETT 2	
RIV1 SETT 4		SETT 3	
RF3		SETT 4	
RIV2 dopo RF3	RF2	SETT 5	RIV1
Fine terapia SETT 12		SETT 6	
SVR12		SETT 7	
SVR24		SETT 8	
	RF3	SETT 9	RIV2
		SETT 10	
		SETT 11	
		SETT 12	
	RF4	SETT 13	Fine terapia SETT 12
		SETT 14	
		SETT 15 - 24	
		SETT 25	SVR12
	RF5	SETT 26	
		SETT 27 - 48	
		SETT 49	SVR24
		SETT 50	
	RF6	SETT 21	
		SETT 22	
		SETT 23	
		SETT 24	
		SETT 25	Fine terapia SETT 24
		SETT 26	
		SETT 27-36	
		SETT 37	SVR12
		SETT 38	
		SETT 39-48	
		SETT 49	SVR24
		SETT 50	

SimPR24 (12_12) caso ideale			
Ordine di inserimento			
RF1	RF1	SETT 1	
RIV1 SETT 4		SETT 2	
RF2		SETT 3	
RF3		SETT 4	
FT con Sim SETT 12	RF2	SETT 5	RIV1 (<25 UI/ml)
12 SETT PegIFN + Rib		SETT 6	
Fine terapia SETT 24		SETT 7	
SVR12		SETT 8	
SVR24	RF3	SETT 9	
		SETT 10	
		SETT 11	
		SETT 12	
	PegIFN + Rib	SETT 13	FT con Sim
		SETT 14	(Non Detectable)
		SETT 15 - 24	
		SETT 25	Fine terapia 24 (12_12)
		SETT 26	
		SETT 27 - 36	
		SETT 37	SVR12
		SETT 38	
		SETT 39 - 48	
		SETT 49	SVR24
		SETT 50	

SimPR48 (12_36) caso ideale			
Ordine di inserimento			
RF1	RF1	SETT 1	
RIV1 SETT 4		SETT 2	
RF2		SETT 3	
RF3		SETT 4	
FT con Sim SETT 12	RF2	SETT 5	RIV1 (<25 UI/ml)
12 SETT PegIFN + Rib		SETT 6	
RIV2 SETT 24		SETT 7	
24 SETT PegIFN + Rib		SETT 8	
Fine terapia SETT 48	RF3	SETT 9	
SVR12		SETT 10	
SVR24		SETT 11	
		SETT 12	
	PegIFN + Rib	SETT 13	FT con Sim
		SETT 14	(Non Detectable)
		SETT 15 - 24	
		SETT 25	RIV2
	PegIFN + Rib	SETT 26	(Non Detectable)
		SETT 27 - 48	
		SETT 49	Fine terapia 48 (12_36)
		SETT 50	
		SETT 51 - 60	
		SETT 62	SVR12
		SETT 63	
		SETT 64 - 72	
		SETT 73	SVR24
		SETT 74	

In RIV2, per i pazienti cirrotici o non tolleranti alla ribavirina e sulla base del giudizio clinico, è possibile prendere in considerazione una durata più lunga del trattamento fino a 24ST (risposta SI a "continua il trattamento")