



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza

Ufficio organizzazione dei servizi

Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461-494165
Fax 0461-494175

www.trentinosalute.net
e mail: serv.politsanitarie@provincia.tn.it

Funzionario di riferimento: dott. Carmine Petti
tel. 0461 494097 fax 0461 494109
Prot. n. S128/2014/ 52985 /22.14.1 - 2014 - 13
(da citare nella corrispondenza)

Trento, - 2 FEB. 2015

Spettabile
AIFA
via del Tritone, 181
00187 - Roma
aifa@aifa.mailcert.it

e p.c. Spettabile
Servizio farmaceutico
Azienda provinciale per i servizi sanitari
via Degasperì, 79
38123- Trento

OGGETTO: centri autorizzati a prescrivere nuovi farmaci

Lo scrivente Servizio comunica l'elenco dei centri autorizzati a prescrivere i farmaci di seguito indicati:

- Iclusig (ponatinib) indicazione terapeutica: pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; Unità operativa di Medicina interna Ematologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Xtandi (enzalutamide) indicazione terapeutica: trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel. Unità operativa di Oncologia medica del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Vyndaqel (tafamidis) indicazione terapeutica: trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la

compromissione neurologica periferica. Unità operative di Neurologia dei presidi ospedalieri di Trento e di Rovereto.

- Giotrif (afatinib) indicazione terapeutica: in monoterapia nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR. Unità operativa di Oncologia medica del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Olysio (simeprevir) indicazione terapeutica: Olysio, in associazione ad altri medicinali, è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) in pazienti adulti. Unità operativa di Gastroenterologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento; Unità operative di Medicina interna – sezione malattie infettive dei presidi ospedalieri di Trento e Rovereto.
- Ilaris (canakinumab) indicazione terapeutica: Ilaris è indicato per il trattamento delle sindromi periodiche associate a criopirina (CAPS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età con peso corporeo pari o superiore a 7,5 kg, comprese: sindrome di Muckle-Wells (MWS); malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID)/sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA); gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria da freddo (FCAS)/orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo. Unità operativa di reumatologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento, Unità operative di Pediatria dei presidi ospedalieri di Trento e Rovereto.
- Soliris (eculizumab) indicazione terapeutica: sindrome emolitico uremica atipica (SEUa). Unità operativa di Nefrologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Simponi (golimumab) indicazione terapeutica: in associazione con metotrexato (MTX) per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici che modificano la malattia (DMARD Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug), incluso MTX, sia stata inadeguata; per il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX. Singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva, negli adulti, qualora sia stata inadeguata la risposta a recenti trattamenti DMARD. Trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva, negli adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali. Unità operativa di Reumatologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.

- Simponi (golimumab) indicazione terapeutica: trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6 – MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie. Unità operativa di Gastroenterologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento; Unità operative di Medicina interna dei presidi ospedalieri di Trento e Rovereto.

Distinti saluti.



Il sostituto dirigente
dott. Andrea Maria Anselmo -

ALS/CP

CP