



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza

Ufficio organizzazione dei servizi

Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461-494165
Fax 0461-494175

www.trentinosalute.net
e mail: serv.politsanitarie@provincia.tn.it

Funzionario di riferimento: dott. Carmine Petti
tel. 0461 494097 fax 0461 494109
Prot. n. S128/2013/ 522344 /22.14.1 – 2014 - 13
(da citare nella corrispondenza)

Trento, **2 OTT. 2014**

Spettabile
AIFA
via del Tritone, 181
00187 – Roma
aifa@aifa.mailcert.it

e p.c. Spettabile
Servizio farmaceutico
Azienda provinciale per i servizi sanitari
via Degasperi, 79
38123- Trento

OGGETTO: centri autorizzati a prescrivere i farmaci bosulif, sirturo, revlimid, yervoy, zytiga

Lo scrivente Servizio comunica l'elenco dei centri autorizzati a prescrivere i farmaci di cui all'oggetto:

- Bosulif (bosutinib) indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate. Unità operativa di Medicina del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Sirturo (bedaquilina) indicazione terapeutica: uso negli adulti come parte di un appropriato regime di associazione per la tubercolosi polmonare multi resistente (MDR TB) quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità. Unità operative di Pneumologia dei presidi ospedalieri di Trento e di Arco. Unità operative di Medicina – sezione Malattie infettive dei presidi ospedalieri di Trento e di Rovereto.
- Revlimid (lenalidomide) indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o

intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q associata ad altre anomalie cromosomiche, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate (legge n. 648 del 1996). Unità operativa di Medicina – sezione di Ematologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.

- Revlimid (lenalidomide) indicazione terapeutica: 1) in associazione con desametasone, trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia; 2) trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni sono insufficienti o inadeguate. Unità operativa di Medicina – sezione di Ematologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento.
- Yervoy (ipilimumab) indicazione terapeutica: trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Unità operativa di Oncologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento
- Zytica (Abiraterone acetato) indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente. Unità operativa di Oncologia del presidio ospedaliero Santa Chiara di Trento

Distinti saluti.

Il sostituto dirigente

- dott. Andrea Maria Anselmo-

