

Gentilissimi,

Vi segnaliamo oggi uno studio pubblicato su JAMA sul rischio di ematoma subdurale associato all'uso di farmaci antitrombotici.

Buona lettura!

 @AIFA_ufficiale

13 marzo 2017

JAMA. Studio sul rischio di ematoma subdurale associato all'uso di farmaci antitrombotici

L'incidenza degli ematomi subdurali, segnalata per essere in aumento, è associata ad un utilizzo crescente di farmaci antitrombotici. È quanto dimostrato da David Gaist del dipartimento di neurologia dell'Università di Odense e dagli altri autori di uno studio pubblicato su JAMA.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

13 marzo 2017

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).