

NATALIZUMAB ED ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE

Al 31 dicembre 2009 nel database GIF/AIFA sono presenti 3 segnalazioni di alterazioni del ciclo mestruale (1 menometrorragia, 1 oligomenorrea e 1 polimenorrea) verificatesi in tre donne (età media 40 anni) con sclerosi multipla in trattamento con natalizumab. Da questi casi emerge un'ampia variabilità nel tempo d'insorgenza della reazione dall'inizio della terapia (da 20 giorni a otto mesi). Per quanto riguarda l'esito, disponibile in 2 casi, vi è stato un miglioramento e una completa guarigione. Il database dell'OMS conteneva, al 10 maggio 2010, 37 segnalazioni di alterazioni del ciclo mestruale da natalizumab. I disturbi del ciclo mestruale non sono citati nella scheda tecnica europea, ma sono riportati in quella statunitense. Questa riporta, infatti, amenorrea (2%), ciclo mestruale irregolare (5%), cisti ovariche (2%) e dismenorrea (2-6%). Tali disordini sono citati anche in altre fonti [1,2]. Le differenze nelle schede tecniche appaiono ingiustificate e sarebbe auspicabile un'uniformità d'informazione.

1. Merck Manual (ultima revisione: dicembre 2009)
2. J Am Pharm Assoc 2005;45:185-218.