



Ufficio Segreteria Organi Collegiali

OdG Ufficio Registri di Monitoraggio - CTS 11, 12, 13 Novembre 2020

A) Schede di registro per valutazione/approvazione CTS

Procedura HTA n°	Tipologia procedura	Farmaco
15407	congiunta HTA/RM	BRAFTOVI (encorafenib)
15520	congiunta HTA/RM	BLEREP (belantamabmafodotin)
14977	classica (su parere CTS)	LORVIQUA (lorlatinib)
15173 e 15174	classica (su parere CTS)	VYNDAQEL (tafamidis)
15124	classica (su parere CTS)	PERJETA (pertuzumab)

B) Controdeduzioni delle Aziende Farmaceutiche a schede già valutate/approvate dalla CTS

Procedura HTA n°	Tipologia procedura	Farmaco
15336	classica (su parere CTS)	ZOLGENSMA (onasemnogeneabeparvovec)

C) Aggiornamento schede di registro già in monitoraggio

Farmaco	Indicazioni
KYMRIAH (tisagenlecleucel)	Kymriah è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.

KYMRIAH (tisagenlecleucel)	Kymriah è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva.
YESCARTA (axicabtagenequiloleucel)	YESCARTA è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-celllymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primarymediastinal large B-celllymphoma, PMBCL) refrattari o recidivanti, dopo due o più linee di terapia sistemica .

D) Approfondimenti

Argomenti
Attività di valutazione dei ticket clinici ricevuti attraverso Helpdesk

E) Audizioni

Ditta	Farmaco	Indicazione
BMS	YERVOY (ipilimumab)	YERVOY è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni

F) Varie ed eventuali