

Scheda di allerta per il paziente

TIRARE

BRIVUDINA DOC (brivudina)

Scheda di allerta per il paziente

Porti sempre con sé questa scheda fino a 4 settimane dopo il termine del trattamento

Questa scheda contiene informazioni di sicurezza importanti che dovrebbe conoscere prima di assumere BRIVUDINA DOC e/o durante il trattamento con BRIVUDINA DOC.

Presenti questa scheda ogni volta che si reca dal medico e dal farmacista prima di ritirare un qualsiasi medicinale.

⚠️ NOTA BENE: L'INTERAZIONE tra BRIVUDINA DOC e alcuni medicinali chemioterapici (per es. capecitabina, 5-fluorouracile, tegafur, ecc.) o medicinali per il trattamento di infezioni fungine contenenti flucitosina è POTENZIALMENTE FATALE.

BRIVUDINA DOC NON DEVE ESSERE USATO da pazienti recentemente sottoposti, attualmente sottoposti o in attesa di essere sottoposti (entro 4 settimane) a chemioterapia antitumorale (per es. capecitabina, 5-fluorouracile (5-FU), tegafur o 5-fluorouracile topico (per uso esterno) ecc.) o da pazienti che hanno recentemente assunto o stanno attualmente assumendo una terapia antifungina con flucitosina.

Prima del trattamento con BRIVUDINA DOC

Prima di assumere BRIVUDINA DOC si rivolga al medico se:

- è stato recentemente sottoposto, è attualmente sottoposto o è in attesa di essere sottoposto (entro 4 settimane) a chemioterapia antitumorale (in particolar modo a capecitabina, 5-fluorouracile (5-FU) o altre fluoropirimidine)
- ha recentemente assunto o sta attualmente assumendo medicinali contenenti flucitosina per il trattamento di una infezione fungina
- ha recentemente assunto, sta attualmente assumendo o sta per assumere un medicinale contro le verruche contenente fluoropirimidine (5-fluorouracile ed altri)
- il suo sistema immunitario (cioè le sue difese corporee contro le infezioni) è gravemente compromesso; ad es. se ha recentemente assunto o sta attualmente assumendo:

- medicinali antitumorali (chemioterapia), o
- medicinali immunosoppressori (medicinali che sopprimono o diminuiscono la funzione del sistema immunitario)

Durante e dopo il trattamento con BRIVUDINA DOC

- Avvisi il medico che usa o ha usato brivudina nelle ultime 4 settimane nel caso debba essere sottoposto a chemioterapia (orale, per iniezione o per via locale, quali creme, unguenti, gocce oculari o ogni altra forma di medicinale per uso esterno) o a terapia antifungina con flucitosina.
- Avvisi il medico se presenta vertigini o malessere, se si ammala o se sviluppa sintomi inattesi dopo aver iniziato la terapia con BRIVUDINA DOC.

Si rechi subito in ospedale se presenta malessere; diarrea; infiammazione della bocca e/o della mucosa interna della bocca; senso di affaticamento, maggiore suscettibilità alle infezioni, stanchezza; eruzione cutanea e rossore su tutto il corpo, con cute dolente al tatto, seguiti da grandi vescicole che portano ad ampie zone di esfoliazione cutanea.

Si protegga dalle infezioni sistemiche e da disidratazione.

Trattamento con brivudina:

Inizio.....

Fine.....

Periodo di attesa dopo l'assunzione di BRIVUDINA DOC:

BRIVUDINA DOC	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4
Tossicità da fluoroprimidine potenzialmente fatale				

Legga il foglio illustrativo di BRIVUDINA DOC per ulteriori informazioni.

Porti sempre con sé ad ogni visita medica l'elenco di tutti i medicinali che assume.

Nome del paziente

Nome del medico

Tel. del medico