

E	Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità	DACOGEN (decitabina) - LAM
O	Campo obbligatorio	

DACOGEN è indicato per il trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'OMS, e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard



1- Scheda Registrazione paziente (RP)		
E	Età	≥65
2- Scheda Eleggibilità e Dati Clinici (EDC)		
O	Diagnosi	Leucemie mieloide acuta (LAM) "de novo" Leucemie mieloide secondaria (LMS) (classificazione OMS)
O	Se LMS indicare	Sindrome mielodisplastica Disordine mieloproliferativo Esposizione ad agente leucemogeno
E	Eleggibilità a chemioterapia di induzione standard	Si No
O	Classificazione FAB	M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
O	Percentuale di blasti midollari (%)	..
E	Pre-trattamento con chemioterapia (ad eccezione di idrossiurea)	Si No
O	Paziente già in trattamento con decitabina per questa indicazione ed in accordo con i criteri della scheda AIFA (DM 08/05/2013)	Si No

blocco

blocca

blocca

FAC SIMILE

Se la risposta alla domanda sopra è si indicare inoltre:		
<input type="radio"/>	Il numero di RF (1 RF= 4 ST) già effettuate	...
<input type="radio"/>	Data dell'inizio trattamento	../../...
<p>* Un ciclo = 4ST</p> <p>Se il valore è 4 compilare la scheda RIV;</p> <p>Se il valore è ≥5 non si applica il CS;</p> <p>Le ST precedenti alla scheda AIFA non entrano nell'applicazione del CS.</p>		

Vedi sotto*

Mielosoppressione		
<input type="radio"/>	Anemia (link al RCP paragrafo 4.2 e 4.4)	Grado 0
		Grado 1
		Grado 2
		Grado 3
		Grado 4
<input type="radio"/>	Neutropenia (link al RCP paragrafo 4.2 e 4.4)	Grado 0
		Grado 1
		Grado 2
		Grado 3
		Grado 4
<input type="radio"/>	Trombocitopenia (link al RCP paragrafo 4.2 e 4.4)	Grado 0
		Grado 1
		Grado 2
		Grado 3
		Grado 4
<input type="radio"/>	Funzionalità epatica (link al RCP paragrafo 4.2, 4.4 e 5.2)	Normale
		Compromessa
<input type="radio"/>	Funzionalità renale (link al RCP paragrafo 4.2, 4.4 e 5.2)	Normale
		Compromessa
<input type="radio"/>	Insufficienza cardiaca congestizia grave o patologia cardiaca clinicamente instabile (link al RCP paragrafo 4.4)	Si
		No

FAC SIMILE

3- Scheda Richiesta farmaco (RF)		
O	Peso del paziente (kg)	..
O	Altezza del paziente (cm)	..
O	Superficie corporea del paziente (m2)	..
O	Data RF	../../....
O	Posologia richiesta	20 mg/m ² per 5 giorni consecutivi ogni 4 settimane
O	Dose totale (mg)	...
	<i>Per le RF successive alla prima:</i>	
O	Si sono verificate reazioni nocive e non volute al medicinale	Si
		No
O	Il ciclo precedente è stato ritardato per tossicità?	Si
		No
	<i>Se si, indicare il ciclo</i>	..
E	Valutazione della funzionalità midollare (emocromo e conta piastrinica) (Link al RCP 4.2 e 4.4)	Si
		No

calcolo in automatico

calcolo in automatico

blocco

FAC SIMILE

4- Scheda Rivalutazione (RIV)		
RV obbligatoria dopo 16 ST (4 cicli).		
O	Data di RV	../../....
O	Stato di malattia	Remissione completa
		Remissione parziale
		Stabilità
		Progressione
O	n° RF inserite prima di questa scheda	..
E	Il paziente continua il trattamento	Si
		No
5- Scheda Fine Trattamento (FT)		
O	Data di FT	../../....
O	Motivo del FT	Progressione
		Tossicità
		Causa non dipendente dal farmaco
		Perso al follow up
		Decesso del paziente
O	Stato di malattia	Remissione completa
		Remissione parziale
		Stabilità
		Progressione
		Seconda neoplasia maligna
		Non valutato
O	Se motivo di FT è decesso indicare la causa del decesso:	Progressione
		Tossicità
		Altro
		Se Altro, indicare:
	Se motivo di FT è decesso indicare la data del decesso:	../../....

blocca e inserire FT
dato in automatico

blocca e inserire FT

Link RNFV

testo libero

FAC SIMILE