

### **Rischio di cancro**

RINVOQ® può potenzialmente aumentare il rischio di sviluppare cancro, in particolare cancro della cute.

Informi il medico se nota qualsiasi variazione nell'aspetto di una zona cutanea, o nota qualsiasi nuova crescita sulla pelle.

### **Rischio di una perforazione dell'intestino**

RINVOQ® può aumentare il rischio di una perforazione dell'intestino, specialmente se ha la malattia di Crohn. Informi immediatamente il medico se ha dolore allo stomaco inspiegabile o inaspettato.

Mostrì questa scheda a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella sua assistenza medica – ad esempio, al dentista o al medico del pronto soccorso.

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato ad Agenzia Italiana del Farmaco, Sito web: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Nome:

Nome del medico specialista – colui che ha prescritto RINVOQ®:

Numero di telefono del medico specialista:

Data di inizio del trattamento con RINVOQ®:

Versione 4.0. Data di approvazione dd mm yyyy.

COD.XX-XXXX-XXXXXX



## **Scheda per il Paziente**

**Tenga questa scheda sempre con sé  
(o presso il caregiver)**

### **Informazioni di sicurezza su RINVOQ®▼ (upadacitinib) per i pazienti**

- Questa scheda contiene importanti informazioni sulla sicurezza delle quali deve essere a conoscenza - prima e durante il trattamento con RINVOQ®.
- Legga il foglio illustrativo per ulteriori informazioni.

## Rischio di infezioni

RINVOQ® può peggiorare un'infezione preesistente o aumentare le probabilità di contrarre una nuova infezione - ad esempio tubercolosi (TB), fuoco di Sant'Antonio o epatite virale.

Informi immediatamente il medico se nota segni di infezione come:

- Febbre, sudorazione, brividi, perdita di peso o tosse persistente – questi possono essere segni di TB.
- Eruzione cutanea dolorosa con comparsa di vescicole – questa può essere un segno del fuoco di Sant'Antonio.
- Sensazione di stanchezza o affanno – questo può essere un segno di polmonite.

## Vaccini – usati per la prevenzione delle infezioni

I vaccini vivi (ad esempio il vaccino antinfluenzale tramite spray nasale, varicella, parotite/morbillo/rosolia) non devono essere somministrati durante il trattamento con RINVOQ®, nè poco prima di iniziare il trattamento con RINVOQ®.

Prima che le venga somministrato qualsiasi vaccino, consulti il medico che saprà quali vaccini **non** somministrare prima o durante il trattamento con RINVOQ®.

## Rischio di malattia cardiaca

Il trattamento con RINVOQ® è stato associato ad aumento del colesterolo (grasso nel sangue). Il medico controllerà i suoi livelli di colesterolo durante la terapia con RINVOQ®.

Informi immediatamente il medico se nota sintomi come dolore o senso di costrizione al torace poichè questo può essere un sintomo di malattia cardiaca.

## Contraccezione, gravidanza e allattamento

RINVOQ® non deve essere assunto durante la gravidanza.

- Usi un metodo contraccettivo efficace durante l'assunzione di RINVOQ® – e per 4 settimane dopo l'ultima dose. Si rivolga al medico per un metodo contraccettivo efficace.
- Informi immediatamente il medico se desidera una gravidanza o se rimane incinta.
- Non allatti durante l'utilizzo di RINVOQ®.

## Rischio di coaguli di sangue nelle vene o nei polmoni

Sono stati osservati coaguli di sangue nelle vene o nei polmoni con RINVOQ®. Informi immediatamente il medico in caso di segni di coaguli di sangue nelle vene o nei polmoni, come in caso di gamba gonfia dolente, respiro affannoso o dolore al torace.