

Terebyo (teriflunomide)

Scheda per il paziente

Questa scheda per il paziente contiene importanti informazioni sulla sicurezza del medicinale di cui deve essere a conoscenza dato che è in trattamento con Terebyo (teriflunomide). Legga attentamente il foglio illustrativo per un'informazione completa.

Mostri questa scheda ad ogni operatore sanitario che si occupi delle sue cure mediche (ad esempio, in caso di una emergenza).

Effetti indesiderati importanti

Teriflunomide riduce l'attività del sistema immunitario (immunomodulatore). Teriflunomide può causare danni epatici (epatite) e può anche ridurre la produzione di globuli bianchi che combattono le infezioni (neutrofili) e piastrine che sono coinvolte nella coagulazione del sangue. La funzione epatica e la pressione del sangue dovrebbero essere controllate regolarmente durante il trattamento con teriflunomide e l'emocromo completo dovrebbe essere eseguito se necessario. Questi controlli dovrebbero essere anche eseguiti prima del trattamento.

Se ha uno di questi sintomi, indice di un possibile effetto indesiderato, contatti immediatamente il medico

- Se la sua pelle o il bianco dei suoi occhi diventano gialli o le urine diventano più scure del normale, manifesta nausea o vomito e dolore addominale, potrebbe avere un problema al fegato.
- Se ha febbre alta, tosse, brividi, linfonodi ingrossati, flusso delle urine ridotto o doloroso, in questo caso potrebbe avere un'infezione.

Per le donne in età fertile incluse le adolescenti e i loro genitori/caregiver

- Non iniziare il trattamento con Terebyo se è incinta o pensa di esserlo. Il suo medico potrà chiederle di eseguire un test di gravidanza per esserne certi.
- Adotti una contraccezione efficace mentre è in trattamento con Terebyo e anche dopo la fine del trattamento. Il suo medico le fornirà informazioni sui potenziali rischi per il feto e sulla necessità di un'efficace contraccezione.
- Contatti il medico se intende cambiare metodo contraccettivo o se pianifica una gravidanza dopo aver interrotto il trattamento con Terebyo.
- Se lei rimanesse incinta o sospetti di esserlo, interrompa l'assunzione di Terebyo (teriflunomide) e contatti immediatamente il suo medico.
- In caso di gravidanza, il suo medico potrà suggerirle il trattamento con alcuni medicinali per accelerare l'eliminazione di teriflunomide.
- Si ricordi anche di discutere con il suo medico se desidera pianificare una gravidanza o se sta allattando con latte materno.
- Per i genitori/caregiver di ragazze: si ricordi di contattare il medico alla comparsa del primo ciclo mestruale per ricevere indicazioni sul rischio a carico del feto e sulla necessità di un'efficace contraccezione.

Nome del paziente:

Data della prima prescrizione di Terebyo:

Nome del centro/recapito:

Nome del medico e numero telefonico:

Materiale educativo approvato da AIFA in data XX/XX/XXXX