

CAMZYOS▼(mavacamten)

SCHEDA PAZIENTE



Istruzioni per il paziente: porti **sempre** con sé questa scheda. Informi il personale sanitario che sta assumendo CAMZYOS.

▼ **Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo.** Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Può far riferimento al sito <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse> per le informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.

CAMZYOS è indicato per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva sintomatica. Per ulteriori informazioni, consulti la Guida per il Paziente e il foglio illustrativo, oppure contatti il servizio di Medical Information di Bristol Myers Squibb al numero 800 864 184 oppure via e-mail a medicalinformation.italia@bms.com.

Informazioni sulla sicurezza per le pazienti in età fertile:

- CAMZYOS può causare danni al nascituro, se utilizzato durante la gravidanza
- Non usi CAMZYOS se è in gravidanza o in età fertile e non sta usando un metodo contraccettivo efficace
- Se Lei è in età fertile, è necessario utilizzare un metodo contraccettivo efficace per tutta la durata del trattamento e per 6 mesi dopo l'ultima dose
- Si rivolga al medico se sta prendendo in considerazione la possibilità di iniziare una gravidanza
- Se sospetta di essere in gravidanza o è in gravidanza, informi **immediatamente** il medico

Informazioni sulla sicurezza per tutti i pazienti:

- Informi **immediatamente** il medico o richieda assistenza medica se manifesta nuovi sintomi o peggioramento dei sintomi di insufficienza cardiaca, tra cui respiro corto, dolore toracico, stanchezza, battito cardiaco accelerato (palpitazioni) o gonfiore delle gambe
- Riferisca al medico di eventuali condizioni mediche nuove o esistenti
- Informi il medico o il farmacista del trattamento con CAMZYOS prima di iniziare qualsiasi nuovo medicinale (inclusi quelli su prescrizione o da banco) o integratori a base di erbe, poiché alcuni di essi possono aumentare la quantità di CAMZYOS nell'organismo e rendere più probabile la comparsa di effetti indesiderati (alcuni dei quali possono essere gravi). Non interrompa l'assunzione né cambi la dose di un medicinale o di un integratore a base di erbe che sta già assumendo senza averne prima parlato con il medico o farmacista, poiché altri farmaci possono influire sulla modalità di azione di CAMZYOS

Si prega di compilare questa sezione o di chiedere al medico che Le ha prescritto CAMZYOS di compilarla.

Nome del paziente: _____

Nome del medico prescrittore: _____

Numero di telefono dell'ufficio: _____

Numero di telefono per reperibilità al di fuori
dall'orario di lavoro: _____

Nome dell'ospedale (se applicabile): _____

