

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio di fase III, pubblicato su The New England Journal of Medicine, che riguarda l'infusione continua dell'antiaggregante sperimentale cangrelor, che ha dimostrato una riduzione degli eventi ischemici a seguito dell'angioplastica.

*Buona lettura,
Luca Pani*

15 aprile 2013

Nuovo farmaco utile per la riduzione degli eventi ischemici dopo angioplastica

Nello studio di fase III denominato CHAMPION PHOENIX, pubblicato su NEJM, l'infusione continua dell'antiaggregante sperimentale cangrelor, un inibitore piastrinico sperimentale del recettore P2Y12, durante l'angioplastica (PCI) ha dimostrato la riduzione del 22% del rischio di eventi ischemici a 48 ore dall'intervento, rispetto a clopidogrel ($P=0,005$) e del 38% del rischio di trombosi dello stent.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

15 aprile 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto
"CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.