

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi una comunicazione dell'FDA sui rischi connessi all'abuso di farmaci a base di fosfato di sodio per il trattamento della costipazione.

Buona lettura,
Luca Pani

29 gennaio 2014

Raccomandazione FDA sull'uso di farmaci da banco a base di fosfato di sodio

La Food and Drug Administration (FDA) ha avvertito che l'uso di più di una dose, in 24 ore, di farmaci a base di fosfato di sodio, per il trattamento della costipazione, può causare danni rari ma gravi ai reni e al cuore. Tali farmaci da banco includono soluzioni orali e clisteri. I consumatori e gli operatori sanitari dovrebbero sempre leggere attentamente le informazioni contenute nel foglio illustrativo di questi farmaci, seguirne le indicazioni e non superare la dosi consigliate.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

29 gennaio 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto
"CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.