

*Cari Colleghi,*

*Vi segnalo oggi uno studio di coorte pubblicato su JAMA che confronta l'anestesia regionale e quella generale negli interventi di ricomposizione di fratture dell'anca.*

*Buona lettura,  
Luca Pani*

**27 giugno 2014**

## **Anestesia regionale vs anestesia generale nella chirurgia dell'anca: uno studio retrospettivo**

L'anestesia regionale è associata a un decorso ospedaliero moderatamente più breve rispetto all'anestesia generale (ma non a una minore mortalità a 30 giorni) negli adulti sottoposti a intervento chirurgico per ricomposizione di fratture dell'anca. È quanto emerge da uno studio retrospettivo di coorte condotto da un team di ricercatori americani guidato da Mark D. Neuman del Dipartimento di Anestesiologia della Scuola di Medicina presso l'Università di Filadelfia, i cui risultati sono stati pubblicati su JAMA (The Journal of the American Medical Association).

***Vai sul sito AIFA per la notizia originale***

**27 giugno 2014**

*"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.*

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto  
"CANCELLAMI" all'indirizzo: [news@aifa.gov.it](mailto:news@aifa.gov.it).

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.