

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi i dati del Rapporto OsMed "L'uso dei farmaci in Italia" 2013 relativi a consumo, spesa e profili di appropriatezza dei farmaci per il diabete.

Buona lettura,
Luca Pani

16 luglio 2014

OsMed 2013: Profili di inapproprietezza nell'uso degli antidiabetici

La prevalenza di utilizzo nell'uso dei farmaci per il diabete in Italia è cresciuta nel 2013 del +3,8% rispetto al 2012. Il dato emerge dall'ultimo Rapporto OsMed "L'uso dei farmaci in Italia" dell'AIFA. Inoltre, gli indicatori di appropriatezza indicano che nel 2013 la percentuale di pazienti che sono in trattamento con inibitori della dipeptidil-peptidasi IV (DPP-IV) pur non rientrando nei criteri previsti dalle precisazioni AIFA sulle limitazioni generali alla rimborsabilità di questi farmaci (precisazioni allegate alla Determina AIFA 961/2013 del 4 Novembre 2013) è risultata del 31,2%, sebbene in calo rispetto al 2012 del -20,4%. Dall'altro lato, la percentuale dei pazienti che non vengono trattati con DPP-IV, pur possedendo i criteri previsti dalle precisazioni AIFA sulle limitazioni generali alla rimborsabilità di questi farmaci, è risultata del 63,2% in calo rispetto al 2012 del -10,9%.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

16 luglio 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.