

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi che il Comitato di valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) ha raccomandato che Protelor/Osseor non debbano più essere usati per il trattamento dell'osteoporosi.

Buona lettura,
Luca Pani

17 gennaio 2014

Il PRAC raccomanda la sospensione dell'uso di Protelor/Osseor (stronzio ranelato)

Il PRAC ha condotto una revisione approfondita prendendo in considerazione i dati disponibili sui benefici e i rischi del medicinale. Il Comitato ha rilevato che per ogni 1000 pazienti trattati per 1 anno vi sono stati 4 casi di problemi cardiaci gravi (inclusi attacchi cardiaci) e 4 casi di coaguli di sangue o ostruzioni dei vasi sanguigni in più con Protelor/Osseor rispetto al placebo (un trattamento senza principio attivo).

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

17 gennaio 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto
"CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.