

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio pubblicato sul *Journal of National Cancer Institute*, secondo cui l'assunzione di statine è associata a una riduzione del rischio di tumore epatico.

Buona lettura,
Luca Pani

20 marzo 2015

Uso statine associato a rischio minore di cancro al fegato secondo uno studio del National Cancer Institute

L'assunzione delle statine è associata ad una riduzione di quasi la metà del rischio di cancro al fegato, secondo i risultati di un nuovo studio pubblicato sul *Journal of National Cancer Institute*.

Ricerche precedenti avevano collegato le statine a un minor rischio di cancro al fegato, ma gran parte delle evidenze proveniva da aree del mondo caratterizzate da tassi elevati di questa forma di cancro. Per questo, i ricercatori hanno analizzato i dati relativi al Regno Unito per studiare gli effetti dell'assunzione di statine in un Paese con una incidenza di cancro al fegato relativamente bassa.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

20 marzo 2015

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a [Medikey](#). L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).