

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio canadese secondo cui, per la gestione del dolore nelle fratture in età pediatrica, l'ibuprofene sarebbe una scelta migliore per alleviare il dolore rispetto alla morfina.

*Buona lettura,
Luca Pani*

3 novembre 2014

CMAJ : meno effetti collaterali con antidolorifico OTC nelle fratture in età pediatrica

Secondo uno studio condotto dal team guidato dal dottor Naveen Ponai del London Health Sciences Center dell'Ontario (Canada) per la gestione del dolore nelle fratture in età pediatrica l'ibuprofene sarebbe una scelta migliore per alleviare il dolore rispetto alla morfina.

Anche se entrambi i farmaci sono efficaci per alleviare il dolore associato a queste lesioni, la morfina per via orale comporterebbe un rischio maggiore di effetti collaterali negativi, secondo quanto riportato dai ricercatori canadesi.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

3 novembre 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).