

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio svedese che ha esaminato l'associazione tra farmaci per la disfunzione erettile e rischio di melanoma.

Buona lettura,
Luca Pani

 [@AIFA_ufficiale](#)
[@Luca_Pani](#)

26 giugno 2015

Associazione tra inibitori Pde-5 per la disfunzione erettile e melanoma cutaneo. Studio su JAMA

Una revisione di dati relativi a oltre 20.000 uomini svedesi ha identificato l'esistenza di un rischio leggermente più elevato di melanoma cutaneo maligno nei soggetti che avevano assunto farmaci per la disfunzione erettile (rispetto a coloro che non li avevano assunti), ma, secondo gli autori, non è stato dimostrato il nesso di causalità. Secondo i ricercatori l'aumento del rischio è attribuibile a fattori legati agli stili di vita, piuttosto che ai farmaci.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

26 giugno 2015

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).