

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi una Nota Informativa Importante AIFA sul rischio di chetoacidosi diabetica durante il trattamento con gli inibitori SGLT2.

Buona lettura,
Luca Pani

 [@AIFA_ufficiale](#)
[@Luca_Pani](#)

21 marzo 2016

AIFA: Nota Informativa Importante sugli inibitori SGLT2

In seguito alla valutazione da parte dell'Agencia Europea per i Medicinali, l'Agencia Italiana del Farmaco rende disponibili importanti raccomandazioni aggiornate sul rischio di chetoacidosi diabetica durante il trattamento con inibitori SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin ed empagliflozin).

[Vai sul sito AIFA per la notizia originale](#)

21 marzo 2016

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).