

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi le nuove raccomandazioni del PRAC sull'uso dei corticosteroidi inalatori nel trattamento della BPCO e il rischio di polmonite.

Buona lettura,

Luca Pani



@AIFA_ufficiale

@Luca_Pani

23 marzo 2016

BPCO: il PRAC rivaluta il rischio noto di polmonite con l'uso dei corticosteroidi inalatori

Il Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza dell'EMA (PRAC) ha rivalutato il rischio noto di polmonite con i farmaci inalatori contenenti corticosteroidi quando utilizzati per il trattamento della malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO).

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

23 marzo 2016

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).