

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio di coorte retrospettivo, pubblicato su *JAMA Neurology*, eseguito da un team di studiosi per determinare gli effetti dell'uso di statine in pazienti affetti da emorragia intracerebrale (ICH).

Buona lettura,
Luca Pani

24 settembre 2014

JAMA Neurology: uso delle statine nell'ospedalizzazione per emorragia intracerebrale

L'uso di statine durante il ricovero è associato a miglioramento della sopravvivenza e una migliore disposizione alla dimissione tra i pazienti colpiti da ictus ischemico.

Per determinare gli effetti dell'uso di statine in pazienti affetti da emorragia intracerebrale (ICH), un team di studiosi ha eseguito uno studio di coorte retrospettivo su 3481 pazienti con ICH ricoverati in 20 ospedali facenti parte di un gruppo sanitario integrato nel corso di un periodo di 10 anni. Le cartelle cliniche elettroniche e i registri elettronici delle farmacie sono stati analizzati per esplorare l'associazione tra uso di statine nei pazienti ricoverati e risultati clinici. Il lavoro è stato pubblicato su *JAMA Neurology*.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

24 settembre 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).