

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi importanti raccomandazioni riguardo alla riduzione della dose iniziale di talidomide in associazione a melfalan e prednisone (MPT) nei pazienti di età superiore ai 75 anni con mieloma multiplo non trattato.

Buona lettura,
Luca Pani

 @AIFA_ufficiale
@Luca_Pani

16 novembre 2015

Nota Informativa Importante su talidomide

Per i pazienti di età superiore ai 75 anni è ora raccomandata una dose iniziale di 100 mg/die di talidomide. Quando utilizzata in associazione a talidomide, deve essere utilizzata una dose iniziale ridotta di melfalan nei pazienti di età superiore ai 75 anni. Il profilo generale delle reazioni avverse segnalate in pazienti di età superiore ai 75 anni trattati con talidomide alla dose di 100 mg una volta al giorno è risultato simile a quello osservato in pazienti di età pari o inferiore ai 75 anni trattati con talidomide alla dose di 200 mg una volta al giorno. Tuttavia, i pazienti di età superiore ai 75 anni sono potenzialmente a rischio di una maggiore frequenza di reazioni avverse gravi.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

16 novembre 2015

“Pillole dal Mondo” è un’iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall’Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell’AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L’esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).