

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi, in occasione della prima Giornata nazionale della Salute della Donna, uno studio sui fattori clinici che possono portare allo sviluppo di pre-eclampsia in gravidanza per individuare le donne a maggior rischio già nelle prime fasi della gestazione.

Buona lettura,
Luca Pani



@AIFA_ufficiale

@Luca_Pani

22 aprile 2016

Pre-eclampsia in gravidanza: studio verifica fattori di rischio

Un gruppo di ricercatori di Toronto ha condotto una revisione sistematica e una meta analisi di 92 studi di coorte, prendendo complessivamente ad esame una popolazione di oltre 25 milioni di donne in gravidanza, per verificare la possibilità di valutare già dalle prime fasi della gestazione il potenziale rischio di sviluppare pre-eclampsia. I risultati dell'indagine, pubblicati sul BMJ e che proponiamo oggi in occasione della 1^a Giornata della Salute della Donna, mostrano che una serie di fattori, da soli o in combinazione, possono identificare le donne a maggior rischio di gestosi in gravidanza. Fra questi si rilevano: sindrome da anticorpi antifosfolipidi, precedente pre-eclampsia, ipertensione cronica, diabete pre-gestazionale, ricorso a tecnologia di riproduzione assistita, indice di massa corporea superiore a 30.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

22 aprile 2016

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).