

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio condotto da un team di ricercatori dal Centro di Scienze della Salute dell'Università del Texas e pubblicato sul "New England Journal of Medicine" dimostra il vantaggio di iniziare la terapia antiretrovirale entro i primi quattro mesi dall'infezione da HIV.

*Buona lettura,
Luca Pani*

19 febbraio 2013

Uno studio americano dimostra l'efficacia del trattamento precoce dell'HIV

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dal Centro di Scienze della Salute dell'Università del Texas e pubblicato sul "New England Journal of Medicine" dimostra il vantaggio di iniziare la terapia antiretrovirale entro i primi quattro mesi dall'infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS.

I ricercatori hanno analizzato i dati di circa 500 pazienti con infezione da HIV- 1 e hanno scoperto che coloro che hanno iniziato la terapia antiretrovirale entro quattro mesi dall'infezione hanno avuto una ripresa maggiore di linfociti T CD4+ rispetto a chi aveva iniziato il trattamento più tardi.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

19 febbraio 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.