

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi lo studio "Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction", che evidenzia come le dosi ridotte di aspirina possono aiutare le donne che hanno avuto un aborto a terminare con successo una seconda gravidanza.

Buona lettura,
Luca Pani

19 marzo 2013

L'aspirina aumenta probabilità di portare a termine seconda gravidanza dopo aborto

Secondo uno studio denominato EAGeR, le dosi ridotte di aspirina possono aiutare le donne che hanno avuto un aborto a portare a termine con successo una seconda gravidanza. Nello studio, presentato al Congresso della Society for Maternal-Fetal Medicine, le donne che l'anno precedente avevano abortito spontaneamente prima delle 20 settimane di gravidanza avevano il 9,2% in più di probabilità di portare a termine con successo una seconda gravidanza quando facevano uso di dosi ridotte di aspirina nel periodo in cui stavano tentando di concepire.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

19 marzo 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.