

Cari Colleghi,

*Vi segnalo oggi uno studio, pubblicato su *The Lancet*, sulla somministrazione di clopidogrel in aggiunta all'anticoagulante nei pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica.*

*Buona lettura,
Luca Pani*

3 aprile 2013

Anticoagulante più aspirina meglio di anticoagulante più doppio antiaggregante

La somministrazione di solo clopidogrel in aggiunta all'anticoagulante, nei pazienti che assumono anticoagulanti orali (TAO) e vengono sottoposti ad una angioplastica coronarica (PCI), (doppia terapia antitrombotica – DAT), permette di ottenere una significativa riduzione dei sanguinamenti con una incidenza simile di eventi trombotici rispetto alla somministrazione di aspirina e clopidogrel in aggiunta all'anticoagulante orale (trippla terapia antitrombotica – TAT). Questi risultati, molto importanti nella gestione dei pazienti sottoposti a PCI, sono stati recentemente pubblicati sul Lancet.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

3 aprile 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.