

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi che l'Agencia Europea dei Medicinali sta riesaminando i dati sul rischio di pancreatite e modificazioni cellulari pre-cancerose nei pazienti con diabete di tipo 2 trattati con agonisti del recettore del peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) e inibitori della dipeptil peptidasi-4 (DPP-4).

*Buona lettura,
Luca Pani*

2 maggio 2013

L'Agencia Europea dei Medicinali esamina i dati sui rischi a livello del pancreas per le terapie basate sul GLP-1 (incretino-mimetici) nel trattamento del diabete di tipo 2

L'Agencia Europea dei Medicinali (EMA) sta riesaminando i dati di un gruppo di ricercatori universitari indipendenti che suggeriscono un aumento del rischio di pancreatite (infiammazione del pancreas) e modificazioni cellulari pre-cancerose chiamate metaplasie del dotto pancreatico nei pazienti con diabete di tipo 2 trattati con agonisti del recettore del peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) e inibitori della dipeptil peptidasi-4 (DPP-4).

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

2 maggio 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.