

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio su JAMA che contraddice una precedente ricerca che aveva individuato una correlazione tra l'uso di fluorochinoloni e l'aumento del rischio di distacco della retina.

*Buona lettura,
Luca Pani*

4 dicembre 2013

JAMA: studio esclude rischio distacco della retina causato da assunzione di fluorochinoloni

I fluorochinoloni non sembrano aumentare il rischio di un problema dell'occhio chiamato "distacco della retina", secondo un nuovo studio che contraddice una ricerca apparsa in precedenza.

Il distacco della retina - separazione della retina dalla sua connessione con la parte posteriore dell'occhio - può causare la perdita della vista. Un gruppo di ricercatori ha recentemente concluso che l'uso di antibiotici chiamati fluorochinoloni era associato ad un aumento significativo del rischio di distacco.

Ma una ricerca che ha coinvolto l'analisi di dati provenienti da milioni di persone in Danimarca contraddice quanto precedentemente affermato.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

4 dicembre 2013

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto
"CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.