

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi una raccomandazione del Centro Statunitense per i Servizi di Prevenzione - US Preventive Services Task Force (USPSTF) sulla possibilità di impiego dell'aspirina a basso dosaggio in gravidanza per donne con rischio di sviluppo di pre-eclampsia.

Buona lettura,
Luca Pani

30 maggio 2014

Aspirina a basso dosaggio per prevenire il rischio di pre-eclampsia in gravidanza

Le donne in gravidanza che hanno maggiore propensione a sviluppare la pre-eclampsia dovrebbero assumere aspirina a basso dosaggio per ridurre il rischio di manifestare la patologia, così come il parto pre-termine e una diminuzione della crescita intrauterina. E' quanto afferma una raccomandazione del Centro Statunitense per i Servizi di Prevenzione - US Preventive Services Task Force (USPSTF) e commentata in un articolo pubblicato su JAMA.

La raccomandazione è valida per le donne che sviluppano complicazioni come la pre-eclampsia in uno stadio iniziale della gravidanza, che non manifestano i sintomi della malattia e che possono assumere in sicurezza l'aspirina. Per queste pazienti, l'USPTF raccomanda di prendere aspirina (da 50mg a 160 mg al giorno) tra la 12^a e la 28^a settimana di gestazione.

[Vai sul sito AIFA per la notizia originale](#)

30 maggio 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.