

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio, pubblicato su *Jama Psychiatry*, che ha dimostrato che la ketamina, somministrata per infusione endovenosa, riduce i sintomi di disordine da stress post-traumatico.

Buona lettura,
Luca Pani

12 agosto 2014

Ketamina per infusione endovenosa riduce sintomi di PTSD in uno studio clinico pilota

Una singola dose di ketamina somministrata tramite infusione endovenosa (IV) ha portato alla rapida riduzione dei sintomi del disordine da stress post-traumatico (PTSD) in uno studio pilota randomizzato in doppio cieco di 41 pazienti affetti da PTSD cronico (Feder A. et al *JAMA Psychiatry* 2014; 71 [6]:. 681-688).

Il trial, condotto presso un unico sito (Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai di New York) ha confrontato la ketamina con un placebo attivo, midazolam.

Ai pazienti sono stati somministrati per infusione endovenosa ketamina cloridrato (0,5 mg/kg) e midazolam (0.045 mg/kg).

[Vai sul sito AIFA per la notizia originale](#)

12 agosto 2014

“Pillole dal Mondo” è un’iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto
“CANCELLAMI” all’indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall’Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.