

*Cari Colleghi,*

*Vi segnalo oggi una meta-analisi, pubblicata sulla rivista "The Lancet", sull'uso prolungato di alcuni antidolorifici della famiglia dei farmaci antinfiammatori non steroidei.*

*Buona lettura,  
Luca Pani*

**5 giugno 2013**

## **L'uso prolungato di antinfiammatori non-steroidi aumenta il rischio d'infarto**

L'uso prolungato di alcuni antidolorifici della famiglia dei FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, è associato a un aumento del rischio di eventi vascolari quali infarto, ictus e morte per eventi cardiovascolari. Sono questi i risultati di una importante meta-analisi pubblicata sulla rivista "**The Lancet**", in cui si sottolinea l'importanza di scegliere in modo ragionato una terapia di lunga durata con FANS.

***Vai sul sito AIFA per la notizia originale***

**5 giugno 2013**

*"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.*

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: [news@aifa.gov.it](mailto:news@aifa.gov.it).

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.