

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi una revisione, pubblicata su PubMed, che ha analizzato le evidenze disponibili per guidare i clinici nella scelta della migliore terapia antiretrovirale per le donne affette HIV.

*Buona lettura,
Luca Pani*

9 maggio 2014

Ottimizzazione della terapia antiretrovirale per le donne affette da HIV

La revisione ha preso in esame le evidenze disponibili per guidare i clinici nella scelta della migliore terapia antiretrovirale (ART) per le donne affette HIV.

Quando si pianificano regimi terapeutici antiretrovirali per le donne, i medici devono essere consapevoli della situazione sociale e della fase del corso della vita della donna, così come dei dati scientifici disponibili sull'efficacia del farmaco individuato in base al sesso. Per molti farmaci, le donne hanno livelli plasmatici più elevati rispetto agli uomini (non è chiaro se sia dovuto al diverso metabolismo nelle donne o al fatto che in media le donne hanno una massa corporea inferiore a quello degli uomini) e presentano più reazioni avverse alla terapia antiretrovirale.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

9 maggio 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.