

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi la notizia diffusa da JAMA relativa ad uno studio pubblicato sulla rivista statunitense circa il rischio di distacco di retina associato all'uso dei Fluorochinoloni.

*Buona lettura,
Luca Pani*

Rischio di distacco di retina associato all'uso di alcuni antibiotici

Uno **studio pubblicato su JAMA** lo scorso 3 aprile evidenzia il rischio di distacco di retina associato all'uso di Fluorochinoloni. Alcuni ricercatori statunitensi e canadesi hanno infatti rilevato che i soggetti in terapia con questa classe di antibiotici sono esposti 4/5 volte di più al possibile distacco della retina, rispetto a coloro che non assumono alcun antibiotico. Ciò significa che 1 soggetto su 2.500 in trattamento con i Fluorochinoloni può sviluppare questo grave danno oculare. La ricerca non ha riportato un aumento del rischio di distacco di retina dopo l'interruzione dell'assunzione dei farmaci.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

5 aprile 2012

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.