

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi la “comunicazione di sicurezza” della Food and Drug Administration sulla possibile incidenza degli inibitori di pompa protonica nell’insorgenza di diarrea da Clostridium difficile.

*Buona lettura,
Luca Pani*

23 maggio 2012

Diarrea da *Clostridium difficile* associata all’uso di inibitori di pompa protonica. “Comunicazione di sicurezza” della FDA

L'uso di inibitori della pompa protonica (IPP) può essere associato ad un aumentato rischio di diarrea da Clostridium difficile (CD). Secondo una “comunicazione di sicurezza” della Food and Drug Administration (FDA) per i pazienti che assumono inibitori della pompa protonica e che sviluppano una diarrea persistente andrebbe considerata la diagnosi di diarrea da CD. La FDA suggerisce ai pazienti in cura con inibitori della pompa protonica e che sviluppano una diarrea che non migliora di consultare il proprio medico. Il trattamento per diarrea da CD prevede la sostituzione dei fluidi e degli elettroliti e l'uso di antibiotici specifici.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

23 maggio 2012

“Pillole dal Mondo” è un’iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto “CANCELLAMI” all’indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall’Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.