

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi che l'FDA ha recentemente emesso un annuncio di sicurezza per raccomandare che il sildenafil non venga prescritto a bambini e adolescenti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH).

*Buona lettura,
Luca Pani*

11 settembre 2012

FDA sconsiglia uso di sildenafil nei bambini con ipertensione polmonare

L'americana Food and Drug Administration ha recentemente rilasciato un annuncio di sicurezza per raccomandare che il sildenafil (Revatio) non venga prescritto nei bambini e negli adolescenti (da un anno a i 17 anni) per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH). Tale raccomandazione si basa su uno studio clinico pediatrico di lungo termine che ha evidenziato che: i bambini che assumevano dosi elevate di sildenafil erano esposti ad un rischio maggiore di decesso rispetto a quelli ai quali erano somministrate basse dosi; bassi dosaggi di sildenafil non sono efficaci nel migliorare la capacità di esercizio dei piccoli pazienti.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

11 settembre 2012

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.