

*Cari Colleghi,*

*Vi segnalo oggi uno studio pubblicato recentemente su [Archive of Internal Medicine](#) sull'aumento del rischio di infarto miocardico associato all'uso di antipsicotici per il trattamento di pazienti anziani affetti da demenza.*

*Buona lettura,  
Luca Pani*

**10 aprile 2012**

## **Antipsicotici: aumento rischio infarto per gli anziani con demenza**

I farmaci antipsicotici utilizzati nel trattamento dei sintomi comportamentali nei pazienti anziani affetti da demenza sono associati ad un aumento del rischio di infarto miocardico, soprattutto durante il primo mese di utilizzo. È quanto emerso da uno studio retrospettivo, realizzato da un'equipe anglo-franco-canadese, pubblicato su [Archives of Internal Medicine](#), una delle riviste di JAMA (Journal of American Medical Association). Lo studio, realizzato su oltre 37.000 pazienti di età superiore ai 66 anni trattati con inibitori della colinesterasi, evidenzia un rischio significativamente più elevato di avere un infarto miocardico entro l'anno successivo per chi assume antipsicotici e suggerisce dunque un attento monitoraggio dei pazienti durante le prime settimane di trattamento.

*[Vai sul sito AIFA per la notizia originale](#)*

**10 aprile 2012**

*"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.*

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: [news@aifa.gov.it](mailto:news@aifa.gov.it).

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.