

3.2.1 FARMACI PER L'IPERTENSIONE E LO SCOMPENSO CARDIACO

Tabella 3.2.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci per l'ipertensione e lo scompenso cardiaco per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	26,8	28,5	27,7	72	115,0	474,8	364,0	2,9
Valle d'Aosta	23,5	24,8	24,2	72	125,2	449,0	350,0	2,4
Lombardia	23,9	24,6	24,3	71	118,5	466,7	348,0	2,4
PA Bolzano	18,4	18,9	18,6	72	120,9	475,7	360,0	2,6
PA Trento	22,8	23,2	23,0	72	112,0	480,2	364,0	2,5
Veneto	25,4	25,3	25,4	71	124,3	497,0	376,1	2,6
Friuli VG	26,4	26,8	26,6	72	122,2	514,8	392,0	2,4
Liguria	26,7	28,4	27,6	73	119,9	442,0	336,0	3,6
Emilia R.	26,0	27,4	26,7	71	115,9	518,9	392,0	2,7
Toscana	26,4	27,6	27,0	72	115,6	507,0	381,0	4,2
Umbria	30,8	32,4	31,6	71	130,3	559,8	397,0	3,4
Marche	27,9	29,3	28,6	72	132,3	485,3	378,0	2,9
Lazio	26,6	27,8	27,2	70	132,0	481,3	369,3	2,9
Abruzzo	28,3	30,4	29,4	70	119,5	418,6	336,0	3,8
Molise	30,0	32,8	31,4	70	120,8	429,6	351,0	3,1
Campania	28,0	29,4	28,7	68	137,2	471,2	364,0	2,5
Puglia	28,9	30,9	29,9	70	118,9	441,9	357,0	2,8
Basilicata	29,6	32,8	31,2	69	137,5	449,1	364,0	3,3
Calabria	29,0	31,1	30,1	69	132,0	450,1	364,0	3,2
Sicilia	27,2	29,9	28,6	70	125,2	487,3	368,0	3,3
Sardegna	26,5	28,0	27,3	71	119,1	452,2	360,0	2,9
Italia	26,5	27,8	27,1	70	123,5	477,8	364,0	2,9
Nord	25,1	26,0	25,5	71	118,7	483,2	364,0	2,6
Centro	27,0	28,3	27,7	71	126,9	496,2	378,0	3,4
Sud e Isole	28,1	30,1	29,1	69	127,4	461,0	364,0	3,0

Tabella 3.2.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci per l’ipertensione e lo scompenso cardiaco nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*													
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=286.957						Nord N=130.690						
45-54 anni	16,3	16,9	17,1	16,7	16,4	-2	14,9	15,5	15,9	15,2	15,3	1	
55-64 anni	16,5	16,9	16,9	16,2	16,4	1	15,6	15,9	15,6	14,9	15,2	2	
65-74 anni	18,2	17,9	18,2	17,8	18,3	3	16,7	16,7	16,8	16,3	16,8	3	
75-84 anni	21,1	20,2	20,5	20,1	20,8	3	19,7	18,5	18,9	18,5	19,2	4	
≥85 anni	25,8	23,7	25,2	23,8	25,4	7	23,3	21,8	22,3	21,9	22,4	2	
Femmine	20,9	20,8	21,2	20,6	20,8	1	19,4	19,4	19,6	19,0	19,1	1	
Maschi	15,1	14,8	14,9	14,6	15,1	3	14,2	13,8	13,9	13,6	14,2	4	
Totale	18,1	18,0	18,2	17,8	18,1	2	16,9	16,8	16,9	16,4	16,8	2	
	Centro N=57.587						Sud N=98.680						
45-54 anni	16,9	17,3	17,1	16,3	15,7	-4	17,6	18,3	18,4	18,6	17,9	-4	
55-64 anni	16,7	17,0	17,1	16,7	16,4	-2	17,6	18,0	18,5	17,6	18,0	2	
65-74 anni	19,2	18,4	18,7	17,9	18,3	2	19,7	19,3	20,0	19,9	20,4	3	
75-84 anni	21,5	21,3	21,4	20,7	20,5	-1	23,4	22,6	23,1	22,8	23,8	4	
≥85 anni	27,3	24,3	26,4	24,6	27,7	13	28,8	26,5	29,5	26,8	29,0	8	
Femmine	22,2	21,5	22,1	21,2	21,2	0	22,2	22,3	23,0	22,6	22,9	1	
Maschi	15,1	15,1	14,8	14,6	14,6	0	16,3	16,0	16,4	16,2	16,5	2	
Totale	18,8	18,5	18,6	18,1	18,1	0	19,4	19,3	19,9	19,5	19,8	2	

segue

Tabella 3.2.1.s2 - continua

	Alta aderenza*											
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=286.957						Nord N=130.690					
45-54 anni	54,9	54,0	54,0	54,6	54,5	0	56,8	55,6	55,1	56,4	56,1	-1
55-64 anni	54,6	54,7	54,1	55,0	54,9	0	56,0	55,9	55,2	56,2	56,3	0
65-74 anni	53,0	53,9	53,0	53,7	53,0	-1	54,3	54,5	54,0	55,2	54,4	-1
75-84 anni	48,2	49,7	49,1	49,7	48,8	-2	49,5	51,1	50,4	51,1	50,0	-2
≥85 anni	40,9	42,7	40,9	42,7	41,6	-3	43,0	44,6	43,8	45,0	43,4	-4
Femmine	48,1	48,6	47,9	48,7	48,5	0	49,5	49,9	49,4	50,3	50,2	0
Maschi	57,3	57,8	57,3	57,8	57,2	-1	58,5	58,6	58,0	58,8	57,9	-2
Totale	52,5	53,0	52,4	53,1	52,6	-1	53,8	54,0	53,5	54,4	53,9	-1
	Centro N=57.587						Sud N=98.680					
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Centro N=57.587						Sud N=98.680					
45-54 anni	55,9	55,5	56,1	56,7	56,6	0	52,2	51,3	51,4	51,3	51,7	1
55-64 anni	55,7	56,4	55,8	57,1	56,9	0	52,2	52,1	51,6	52,3	52,1	0
65-74 anni	53,5	54,9	55,0	55,7	55,2	-1	51,1	52,2	50,1	50,6	49,8	-2
75-84 anni	48,7	50,2	50,0	51,2	50,5	-1	45,6	46,5	46,1	46,1	45,5	-1
≥85 anni	39,5	42,5	40,2	42,8	41,6	-3	38,8	39,6	36,2	38,3	38,3	0
Femmine	48,4	49,4	49,4	50,3	50,0	-1	46,1	46,3	45,0	45,6	45,3	-1
Maschi	58,2	59,4	59,1	59,8	59,3	-1	55,2	55,6	55,2	55,2	55,0	0
Totale	53,0	54,1	53,9	54,8	54,4	-1	50,5	50,8	49,9	50,2	49,9	-1

* L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023. Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up: 328 (282-348).

Tabella 3.2.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci per l’ipertensione e lo scompenso cardiaco nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi												
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=286.957						Nord N=130.690					
45-54 anni	54,6	54,3	53,7	55,6	56,3	1	55,4	54,9	53,5	56,5	56,5	0
55-64 anni	54,7	55,1	54,1	55,9	56,2	1	54,9	55,5	53,8	56,0	55,9	0
65-74 anni	53,0	53,9	52,2	54,3	53,8	-1	53,1	53,8	51,8	54,8	53,7	-2
75-84 anni	47,5	48,8	47,9	49,1	48,8	-1	48,0	49,6	48,0	49,5	49,0	-1
≥85 anni	40,5	42,8	41,4	43,3	42,1	-3	41,4	44,2	42,9	44,4	42,6	-4
Femmine	48,2	49,1	47,9	49,7	49,8	0	48,4	49,4	47,7	50,0	49,7	-1
Maschi	56,9	57,5	56,4	58,0	57,8	0	57,0	57,8	56,1	58,1	57,5	-1
Totale	52,3	53,1	52,0	53,6	53,6	0	52,5	53,4	51,7	53,9	53,4	-1
	Centro N=57.587						Sud N=98.680					
45-54 anni	54,6	55,7	55,7	57,4	58,2	1	53,7	52,9	52,9	53,6	55,1	3
55-64 anni	54,9	56,6	55,6	57,7	58,5	1	54,3	53,8	53,5	54,7	55,2	1
65-74 anni	52,8	55,6	54,4	56,2	56,2	0	52,9	52,9	51,3	52,4	52,5	0
75-84 anni	47,8	50,1	48,9	50,4	51,2	2	46,4	46,2	46,8	47,4	46,8	-1
≥85 anni	40,0	42,9	41,4	43,8	42,5	-3	39,5	40,1	38,8	40,8	40,7	0
Femmine	47,7	50,3	49,5	51,2	52,0	2	48,1	47,9	47,3	48,3	48,7	1
Maschi	57,3	59,0	58,2	59,7	59,7	0	56,4	56,2	55,8	56,7	57,1	1
Totale	52,2	54,4	53,6	55,2	55,6	1	52,1	51,9	52,3	52,6	52,7	0

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un’interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici)

Tabella 3.2.1.s4 Persistenza al trattamento con farmaci per l'ipertensione e lo scompenso cardiaco nella popolazione di età ≥45 anni con 5 anni di follow-up

Persistenza (%)	Totale N=235.825						Nord N=106.199						Centro N=48.197						Sud N=81.429					
	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi		12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi		12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi		12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi	
45-54 anni	49,6	41,6	37,2	35,2	32,8		49,8	41,7	36,8	34,9	32,4		49,9	42,4	38,6	36,7	34,7		49,3	41,2	36,9	34,6	32,2	
55-64 anni	50,3	42,5	38,1	36,0	33,6		50,3	42,1	37,5	35,4	33,0		50,6	43,6	39,7	37,7	35,4		50,2	42,3	37,9	35,8	33,2	
65-74 anni	49,1	41,4	37,2	35,2	33,0		48,8	41,0	36,5	34,6	32,3		49,1	42,1	38,4	36,5	34,6		49,6	41,5	37,5	35,3	33,1	
75-84 anni	44,6	36,9	32,8	30,7	28,9		44,8	36,9	32,7	30,7	29,0		45,6	37,7	34,0	31,8	30,1		43,5	36,3	32,0	29,8	27,7	
≥85 anni	38,3	30,1	26,7	24,6	23,1		38,3	30,0	26,4	24,2	22,8		39,6	30,5	27,3	25,7	24,6		37,1	29,9	26,5	24,5	22,3	
Femmine	44,4	36,5	32,5	30,6	28,6		44,2	36,2	32,0	30,1	28,1		44,4	37,1	33,6	31,7	29,9		44,7	36,6	32,6	30,6	28,4	
Maschi	53,3	45,5	40,9	38,7	36,4		53,1	45,1	40,2	38,0	35,7		53,9	46,5	42,6	40,4	38,5		53,2	45,4	40,9	38,6	36,2	
Totale	48,6	40,8	36,5	34,5	32,3		48,5	40,5	35,9	33,9	31,7		48,9	41,5	37,8	35,8	34,0		48,7	40,8	36,6	34,4	32,1	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate durante il primo anno di trattamento. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici). N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2019-31/12/2019, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2019 e seguiti per 5 anni di follow-up.

3.2.2 IPOLIPEMIZZANTI

Tabella 3.2.2.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci ipolipemizzanti per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	15,7	15,0	15,3	71	104,6	272,2	240,0	3,2
Valle d'Aosta	12,9	11,7	12,3	71	114,1	252,8	224,0	3,7
Lombardia	15,8	15,0	15,4	71	120,0	272,5	240,0	2,5
PA Bolzano	11,7	10,6	11,2	72	103,0	325,6	280,0	2,0
PA Trento	14,4	14,0	14,2	71	113,5	295,6	252,0	2,6
Veneto	16,2	14,8	15,5	71	109,5	298,8	270,0	2,8
Friuli VG	16,1	15,4	15,8	72	114,6	312,3	270,0	2,4
Liguria	15,9	16,0	16,0	73	106,1	270,7	240,0	4,6
Emilia R.	16,9	17,2	17,1	71	99,3	272,1	240,0	3,1
Toscana	16,2	16,0	16,1	72	97,2	278,4	240,0	5,8
Umbria	16,2	16,0	16,1	72	100,6	270,1	240,0	5,1
Marche	19,6	19,8	19,7	71	114,8	286,0	261,3	3,6
Lazio	16,7	17,3	17,0	70	111,3	265,2	240,0	3,7
Abruzzo	17,4	17,8	17,6	70	104,1	245,3	210,0	5,7
Molise	17,0	17,7	17,4	70	107,3	243,5	211,8	4,4
Campania	18,5	19,4	19,0	68	111,3	261,4	240,0	4,3
Puglia	18,7	19,5	19,1	70	100,6	261,7	225,3	3,4
Basilicata	18,5	19,7	19,1	69	104,8	261,6	235,0	5,2
Calabria	18,1	19,0	18,6	69	100,9	252,0	224,0	6,2
Sicilia	18,3	19,7	19,0	69	101,2	259,4	240,0	5,3
Sardegna	17,3	19,4	18,4	71	111,8	295,4	261,3	3,9
Italia	16,9	17,0	17,0	70	107,9	271,5	240,0	3,8
Nord	15,9	15,3	15,6	71	110,7	279,7	240,0	2,9
Centro	16,9	17,1	17,0	71	106,9	272,5	240,0	4,4
Sud e Isole	18,3	19,3	18,8	69	105,1	261,5	240,0	4,6

Tabella 3.2.2.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci ipolipemizzanti nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*													
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=355.452						Nord N=149.958						
45-54 anni	15,7	14,3	15,5	15,5	14,6	-6	12,9	12,2	13,3	13,0	12,9	-1	
55-64 anni	15,1	14,1	14,4	14,3	13,0	-9	13,1	11,7	12,1	11,7	10,9	-7	
65-74 anni	16,1	15,2	15,2	14,3	13,3	-7	14,1	13,0	13,3	12,0	11,4	-5	
75-84 anni	16,8	16,7	16,1	15,7	14,6	-7	15,0	14,5	14,0	13,7	12,5	-9	
≥85 anni	19,1	19,0	18,2	18,0	16,9	-6	17,3	16,1	15,9	15,5	14,8	-4	
Femmine	18,0	17,0	16,8	16,3	14,9	-8	16,1	40,5	14,8	13,9	13,0	-7	
Maschi	13,9	13,0	13,5	13,3	12,5	-6	11,9	51,2	11,4	11,0	10,5	-5	
Totale	16,0	15,1	15,3	14,9	13,8	-7	14,0	12,9	13,2	12,6	11,9	-6	
	Centro N=71.283						Sud N=134.211						
45-54 anni	16,3	14,6	16,0	15,3	14,5	-5	17,7	16,3	17,7	17,9	16,3	-9	
55-64 anni	15,2	14,2	14,7	14,5	13,0	-10	16,9	16,6	16,7	17,0	15,3	-10	
65-74 anni	16,2	15,5	14,9	14,4	12,5	-13	18,0	17,7	17,8	16,9	15,8	-7	
75-84 anni	17,7	17,4	16,9	15,8	15,0	-5	18,8	19,5	18,9	18,7	17,2	-8	
≥85 anni	19,1	20,2	18,3	17,3	16,0	-7	21,1	22,1	21,1	21,8	20,3	-7	
Femmine	18,4	38,1	17,1	16,3	14,7	-10	19,6	35,3	19,0	18,8	17,2	-9	
Maschi	14,1	48,2	13,6	13,4	12,3	-8	15,8	45,0	16,1	16,1	14,8	-8	
Totale	16,4	15,5	15,5	15,0	13,6	-9	17,9	17,5	17,7	17,6	16,1	-8	

segue

Tabella 3.2.2.s2 - continua

Alta aderenza*														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=355.452							Nord N=149.958						
45-54 anni	41,7	42,7	42,3	42,8	43,6	2		45,9	46,2	45,3	45,9	45,7	0	
55-64 anni	42,2	43,8	43,7	44,3	46,1	4		45,1	46,8	46,5	47,7	49,0	3	
65-74 anni	41,8	42,6	43,4	44,3	46,2	4		44,7	45,3	45,8	47,0	48,3	3	
75-84 anni	41,9	42,2	43,7	43,9	45,6	4		43,9	44,5	46,1	46,4	48,2	4	
≥85 anni	41,6	40,9	42,0	43,4	44,4	2		44,4	43,5	44,6	46,4	47,6	3	
Femmine	37,2	38,1	39,1	40,1	42,0	5		39,5	40,5	41,6	42,7	44,2	4	
Maschi	47,2	48,4	48,3	48,6	49,8	3		50,2	51,2	50,9	51,7	52,6	2	
Totale	41,9	42,8	43,3	44,0	45,6	4		44,8	45,6	46,0	46,9	48,1	3	
	Centro N=71.283							Sud N=134.211						
45-54 anni	40,8	42,8	43,0	43,4	43,8	1		38,6	39,3	38,9	39,6	41,6	5	
55-64 anni	42,8	44,2	44,0	43,9	46,0	5		39,4	40,5	40,3	40,9	43,0	5	
65-74 anni	41,8	42,2	44,1	44,4	47,3	7		38,8	39,5	40,0	41,2	43,2	5	
75-84 anni	42,0	41,5	42,9	43,7	45,1	3		39,2	39,1	40,4	40,3	42,2	5	
≥85 anni	42,2	41,4	43,8	43,9	45,0	2		38,1	37,0	37,2	39,2	40,0	2	
Femmine	37,0	38,1	39,5	40,1	42,4	6		35,0	35,3	35,9	37,1	39,4	6	
Maschi	47,7	48,2	48,6	48,6	50,0	3		43,8	45,0	44,7	44,9	46,6	4	
Totale	42,0	42,7	43,6	43,9	45,8	4		39,0	39,7	39,9	40,6	42,6	5	

* L'aderenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023. Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up: 323 (270-346).

Tabella 3.2.2.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci ipolipemizzanti nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=355.452							Nord N=149.958						
45-54 anni	46,5	48,2	47,2	49,2	49,0	0		49,7	51,2	49,1	51,9	49,9	-4	
55-64 anni	48,7	50,3	50,3	51,7	52,5	1		51,2	53,1	51,7	54,0	53,5	-1	
65-74 anni	48,0	49,1	49,6	52,1	52,3	0		50,1	51,0	50,8	54,0	53,0	-2	
75-84 anni	45,6	45,9	46,7	48,2	48,9	1		47,1	48,1	48,2	49,8	49,9	0	
≥85 anni	42,7	42,5	43,3	45,4	45,4	0		45,8	45,4	45,1	47,5	47,4	0	
Femmine	43,6	45,1	45,6	47,9	48,5	1		45,1	46,8	46,5	49,6	48,9	-1	
Maschi	51,3	52,5	52,3	53,6	53,8	0		53,9	55,2	54,1	55,9	55,2	-1	
Totale	47,2	48,5	48,7	50,5	50,9	1		49,4	50,8	50,1	52,5	51,8	-1	
	Centro N=71.283							Sud N=134.211						
45-54 anni	46,4	48,7	49,2	51,0	51,9	2		44,0	45,0	44,2	45,9	46,9	2	
55-64 anni	48,6	51,6	52,3	53,4	55,0	3		46,5	46,7	47,8	48,5	50,2	4	
65-74 anni	48,2	50,3	52,1	53,7	55,3	3		45,9	46,2	46,7	49,0	50,0	2	
75-84 anni	45,5	45,4	47,5	49,5	50,7	2		43,7	42,8	43,7	45,0	46,4	3	
≥85 anni	43,0	42,8	44,9	46,3	47,6	3		39,1	38,5	39,8	42,0	41,3	-2	
Femmine	43,3	45,7	47,4	49,2	50,9	4		42,3	42,7	43,5	45,4	46,7	3	
Maschi	51,6	53,4	54,3	55,5	56,3	2		48,4	48,5	48,9	49,8	50,9	2	
Totale	47,2	49,2	50,5	52,0	53,4	3		45,1	45,3	45,9	47,4	48,6	3	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).

Tabella 3.2.2.s4 Persistenza al trattamento con farmaci ipolipemizzanti nella popolazione di età ≥45 anni con 5 anni di follow-up

Persistenza (%)	Totale N=207.704					Nord N=82.954					Centro N=41.818					Sud N=82.932				
	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi	12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi
45-54 anni	41,4	31,4	26,2	23,7	21,3	44,1	34,5	28,6	26,1	23,8	41,1	31,2	26,8	24,1	21,6	39,2	29,0	23,9	21,4	19,2
55-64 anni	44,3	34,1	29,0	26,5	23,9	46,9	36,5	31,0	28,6	25,8	43,8	34,4	29,5	27,2	24,7	42,2	31,8	26,9	24,2	21,7
65-74anni	44,3	34,4	29,3	26,7	24,3	46,1	36,2	30,8	28,5	25,8	44,6	34,8	29,7	27,0	25,0	42,2	32,4	27,5	24,7	22,3
75-84 anni	41,9	32,1	27,1	24,5	22,1	43,0	33,3	28,2	25,8	23,5	41,8	32,3	27,8	24,9	22,7	40,5	30,4	25,2	22,4	19,8
≥85anni	38,8	28,9	23,6	20,6	18,3	41,9	32,0	26,2	23,0	20,5	38,3	28,2	23,1	19,9	18,0	35,5	25,6	20,9	18,4	15,9
Femmine	39,6	29,3	24,1	21,4	19,0	41,1	30,6	25,1	22,6	20,0	39,2	29,2	24,4	21,6	19,4	38,5	28,0	22,9	20,1	17,8
Maschi	47,3	37,8	32,8	30,3	27,8	49,7	40,3	34,9	32,6	30,0	47,4	38,2	33,5	30,9	28,7	44,6	34,9	30,1	27,5	25,0
Totale	43,2	33,3	28,1	25,5	23,1	45,3	35,3	29,9	27,4	24,9	43,0	33,4	28,6	25,9	23,7	41,2	31,1	26,1	23,4	21,0

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate durante il primo anno di trattamento. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).
N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2019-31/12/2019, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2019 e seguiti per 5 anni di follow-up.

3.3.1 ANTIDIABETICI

Tabella 3.3.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci antidiabetici per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	7,4	5,6	6,5	73	387,1	404,8	336,0	2,6
Valle d'Aosta	6,3	4,5	5,4	72	318,5	430,4	315,0	2,2
Lombardia	6,7	4,8	5,7	72	569,6	389,8	320,9	2,4
PA Bolzano	4,8	3,6	4,2	72	434,6	430,8	337,5	2,2
PA Trento	5,8	4,5	5,1	72	321,1	352,6	280,0	2,7
Veneto	6,4	4,6	5,5	72	374,0	397,0	336,0	2,5
Friuli VG	7,4	5,3	6,3	73	366,1	409,7	336,0	2,4
Liguria	6,9	5,3	6,1	74	361,2	368,9	300,0	4,2
Emilia R.	6,3	4,9	5,6	72	272,7	368,2	300,0	3,0
Toscana	7,6	6,2	6,9	73	296,7	344,8	272,0	4,7
Umbria	7,9	6,2	7,1	73	392,2	378,6	330,0	3,7
Marche	7,3	5,7	6,5	73	377,6	399,8	336,0	3,3
Lazio	7,6	6,9	7,2	70	332,2	350,6	270,0	4,2
Abruzzo	8,1	6,7	7,4	72	370,6	365,9	302,7	4,3
Molise	8,5	7,1	7,8	72	303,9	323,1	270,0	4,4
Campania	8,4	6,9	7,7	71	371,0	374,1	326,0	3,9
Puglia	8,5	7,7	8,1	71	366,3	372,6	302,5	3,6
Basilicata	9,2	8,1	8,6	71	383,7	383,1	315,0	3,6
Calabria	9,8	8,7	9,2	70	311,2	344,8	279,0	4,9
Sicilia	8,8	7,7	8,2	71	316,6	371,9	300,0	3,8
Sardegna	8,0	6,3	7,1	71	365,3	384,8	330,0	3,7
Italia	7,5	6,1	6,8	71	377,5	375,2	306,0	3,5
Nord	6,7	4,9	5,8	72	429,9	390,1	322,5	2,7
Centro	7,6	6,5	7,0	72	331,0	356,6	280,5	4,2
Sud e Isole	8,6	7,4	8,0	71	349,1	369,9	306,0	3,9

Tabella 3.3.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci antidiabetici nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=89.309							Nord N=33.378						
45-54 anni	22,3	21,7	21,6	19,6	19,6	0		17,2	16,0	15,9	14,1	14,4	2	
55-64 anni	25,4	24,3	23,0	20,8	20,8	0		20,4	18,6	18,0	15,9	16,0	1	
65-74 anni	30,0	29,5	28,9	24,7	23,2	-6		24,6	24,1	24,8	19,1	17,7	-7	
75-84 anni	34,0	33,5	32,4	27,7	24,6	-11		30,7	29,5	28,6	23,9	20,7	-13	
≥85 anni	36,9	37,1	34,6	28,6	24,7	-14		32,5	32,1	30,5	26,0	21,7	-17	
Femmine	32,3	31,7	30,2	28,1	26,2	-7		27,8	26,7	25,9	23,6	21,2	-10	
Maschi	25,9	24,6	24,3	20,6	19,7	-4		22,0	20,1	20,5	16,5	15,8	-4	
Totale	28,9	27,9	27,1	23,9	22,6	-5		24,6	23,0	22,8	19,4	18,1	-7	
	Centro N=20.131							Sud N=35.800						
45-54 anni	25,7	25,1	24,1	23,4	22,7	-3		24,5	24,3	24,9	22,3	22,1	-1	
55-64 anni	27,5	26,9	26,0	23,1	23,0	0		28,2	27,1	25,5	23,7	23,5	-1	
65-74 anni	32,0	31,3	31,6	25,8	26,1	1		33,6	33,3	31,4	29,5	26,5	-10	
75-84 anni	35,3	35,1	35,0	29,5	24,2	-18		37,0	36,8	35,5	31,5	29,4	-7	
≥85 anni	37,6	39,9	38,9	30,6	24,5	-20		41,3	40,5	36,4	30,5	28,5	-7	
Femmine	34,0	34,0	33,2	30,7	27,5	-10		35,1	34,3	32,3	30,7	29,8	-3	
Maschi	28,0	26,9	26,8	22,0	21,5	-2		28,5	27,5	26,9	24,3	22,5	-7	
Totale	30,9	30,3	29,9	25,9	24,3	-6		31,6	30,7	29,5	27,2	25,8	-5	
segue														

segue

Tabella 3.3.1.s2 - continua

Alta aderenza*												
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=89.309						Nord N=33.378					
45-54 anni	36,8	37,1	38,1	39,8	38,2	-4	42,8	45,0	46,1	47,2	44,8	-5
55-64 anni	32,4	33,5	35,3	37,3	36,0	-3	38,9	41,3	42,3	44,2	42,0	-5
65-74 anni	26,3	26,5	28,1	32,2	31,1	-3	31,0	32,4	33,6	38,3	36,0	-6
75-84 anni	24,1	23,8	24,9	31,2	28,6	-8	27,2	27,0	28,7	34,2	31,0	-9
≥85 anni	23,9	21,5	24,0	30,2	27,7	-8	26,7	25,2	27,9	33,0	29,4	-11
Femmine	25,9	25,7	27,1	29,5	28,0	-5	30,3	31,1	32,8	34,7	32,9	-5
Maschi	31,6	32,8	34,2	38,0	35,9	-6	35,8	38,3	39,1	42,7	39,3	-8
Totale	28,9	29,5	30,9	34,3	32,4	-6	33,4	35,15	36,3	39,4	36,6	-7
	Centro N=20.131						Sud N=35.800					
45-54 anni	33,4	32,0	34,3	35,5	33,7	-5	33,9	33,7	33,5	36,1	35,3	-2
55-64 anni	28,7	28,7	31,7	35,6	32,3	-9	29,3	30,4	31,2	32,4	33,0	2
65-74 anni	24,3	21,9	24,8	31,7	28,6	-10	23,2	24,3	24,7	26,8	28,1	5
75-84 anni	22,4	20,3	21,4	31,2	27,9	-11	21,5	22,8	22,4	27,5	26,3	-4
≥85 anni	27,1	20,5	20,9	29,7	24,7	-17	18,8	18,3	21,7	26,9	27,7	3
Femmine	24,2	21,8	23,3	28,0	25,1	-10	23,0	23,7	24,2	25,8	25,6	-1
Maschi	29,2	28,0	31,3	37,1	33,7	-9	28,9	30,6	30,7	33,4	33,8	1
Totale	26,7	25,1	27,4	33,0	29,7	-10	26,1	27,4	27,7	29,9	30,0	0

*L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023.

† Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up: 331 (287-350).

^ Esclusa Emilia Romagna

Tabella 3.3.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con antidiabetici nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

	Persistenza a 12 mesi						
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	Δ % 24-23
	Totale N=89.309						
45-54 anni	44,6	48,8	48,3	50,5	50,2	-1	4
55-64 anni	44,4	47,3	48,1	50,6	51,6	2	6
65-74 anni	39,5	42,5	42,4	47,8	49,1	3	14
75-84 anni	32,5	35,5	36,6	44,2	46,3	5	22
≥85 anni	26,9	29,1	30,4	39,5	44,3	12	18
Femmine	36,1	39,2	39,9	43,0	45,1	5	8
Maschi	42,0	46,1	45,9	51,0	51,8	2	12
Totale	39,2	42,9	43,1	47,5	48,8	3	11
	Centro N=20.131						
45-54 anni	39,7	46,0	45,3	45,9	48,0	1	7
55-64 anni	42,0	44,7	47,3	49,9	49,8	6	4
65-74 anni	37,6	43,1	41,3	49,1	48,0	19	7
75-84 anni	29,7	35,8	36,2	45,4	47,4	25	16
≥85 anni	24,7	28,8	28,5	41,9	45,4	47	34
Femmine	32,9	37,8	38,0	42,5	44,3	12	5
Maschi	39,7	45,4	45,5	51,5	51,3	13	9
Totale	36,4	41,8	41,8	47,4	48,1	13	7
	Sud N=35.800						
45-54 anni							
55-64 anni							
65-74 anni							
75-84 anni							
≥85 anni							
Femmine							
Maschi							
Totale							

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).

^ Esclusa Emilia Romagna

Tabella 3.3.2.s4 Esposizione e durata di terapia di farmaci per l’ulcera peptica e MRGE per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	15,8	19,5	17,7	70	55,2	136,9	112,0	17,6
Valle d'Aosta	15,7	19,2	17,5	69	60,9	151,0	112,0	17,7
Lombardia	15,2	18,5	16,9	69	63,8	163,2	140,0	15,1
PA Bolzano	9,7	11,3	10,5	69	59,3	141,7	88,7	21,6
PA Trento	15,3	18,7	17,0	68	71,0	175,8	140,0	17,3
Veneto	11,9	14,0	12,9	71	65,7	168,0	132,0	17,7
Friuli VG	14,3	17,8	16,1	70	62,5	151,9	112,0	16,2
Liguria	18,9	23,6	21,3	72	64,1	158,3	140,0	15,8
Emilia R.	14,0	17,7	15,9	69	57,7	139,0	94,7	19,8
Toscana	12,8	15,1	14,0	72	52,4	130,2	84,0	24,2
Umbria	12,7	14,6	13,7	72	48,3	123,0	84,0	23,8
Marche	15,8	18,2	17,0	72	57,0	136,8	112,0	19,8
Lazio	17,1	21,1	19,2	69	54,7	134,4	88,0	20,1
Abruzzo	18,8	22,8	20,9	69	52,0	126,5	84,0	21,0
Molise	21,3	25,5	23,4	70	60,7	150,3	112,0	17,7
Campania	23,1	27,4	25,3	66	58,5	143,4	112,0	17,2
Puglia	18,4	21,3	19,9	69	57,5	140,4	112,0	18,5
Basilicata	22,4	26,9	24,7	69	56,6	136,0	112,0	19,4
Calabria	21,4	24,9	23,2	70	56,7	140,4	112,0	18,6
Sicilia	19,8	24,7	22,3	70	57,5	149,5	112,0	20,3
Sardegna	19,4	24,7	22,1	68	61,7	159,0	112,0	20,2
Italia	16,7	20,3	18,5	69	58,7	146,4	112,0	18,5
Nord	14,6	17,9	16,2	70	61,7	154,7	112,0	16,9
Centro	15,2	18,4	16,9	70	54,0	133,0	93,3	21,3
Sud e Isole	20,6	24,8	22,7	68	57,8	144,2	112,0	18,8

3.4.1 ANTIBIOTICI

Tabella 3.4.1.s1 Esposizione e durata di terapia di antibiotici per uso sistemico per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	29,0	36,1	32,6	53	22,2	14,1	10,0	41,0
Valle d'Aosta	24,9	32,8	28,9	53	22,2	14,6	10,0	38,4
Lombardia	26,9	32,7	29,9	49	23,6	15,0	11,2	36,9
PA Bolzano	23,0	28,3	25,6	44	19,7	12,8	10,0	47,0
PA Trento	28,6	35,3	32,0	48	21,9	14,8	10,0	38,9
Veneto	25,8	31,7	28,8	50	21,8	14,5	10,0	40,2
Friuli VG	24,9	31,4	28,2	52	22,9	16,4	14,0	30,4
Liguria	29,2	36,0	32,7	56	25,4	14,7	11,0	37,6
Emilia R.	28,9	35,9	32,4	50	21,2	14,4	10,0	40,4
Toscana	32,3	39,1	35,8	54	22,1	14,6	10,0	46,2
Umbria	40,9	48,5	44,8	53	25,1	15,8	12,0	37,5
Marche	40,4	47,5	44,1	52	27,2	15,0	10,0	39,0
Lazio	36,8	45,3	41,2	53	29,1	15,3	10,0	38,0
Abruzzo	41,7	49,4	45,6	53	27,2	15,0	10,0	40,8
Molise	42,4	50,1	46,3	54	28,6	14,9	10,0	38,6
Campania	40,6	47,7	44,2	52	31,3	14,8	10,0	39,4
Puglia	41,6	49,3	45,6	53	26,9	14,4	10,0	42,0
Basilicata	42,2	50,5	46,4	54	26,5	14,6	10,0	41,0
Calabria	40,2	46,5	43,4	55	31,5	15,1	10,0	38,9
Sicilia	39,3	46,7	43,1	54	25,2	13,9	10,0	44,6
Sardegna	31,1	39,3	35,2	53	24,4	14,3	10,0	43,4
Italia	33,3	40,3	36,8	52	25,6	14,7	10,0	40,2
Nord	27,3	33,7	30,6	51	22,7	14,6	10,0	38,7
Centro	36,2	43,9	40,1	53	26,5	15,1	10,0	40,4
Sud e Isole	39,8	47,2	43,6	53	28,1	14,5	10,0	41,5

3.5.1 ANTICOAGULANTI

Tabella 3.5.1.s1 Esposizione e durata di terapia di anticoagulanti per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)		Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine					
Piemonte	5,7	5,7	76	232,5	163,6	140	11,0
Valle d'Aosta	6,0	5,4	74	246,4	162,2	120	10,4
Lombardia	5,7	5,9	74	273,0	147,8	105	15,6
PA Bolzano	5,7	5,4	74	244,9	163,3	132	13,2
PA Trento	6,1	6,0	73	190,5	147,9	96	14,7
Veneto	5,4	5,0	77	263,6	187,1	180	10,5
Friuli VG	6,3	5,9	77	280,3	190,3	180	9,6
Liguria	6,9	7,4	76	216,1	151,5	100	11,7
Emilia R.	5,8	5,8	76	235,0	169,5	144	17,6
Toscana	6,9	7,3	76	182,5	138,9	90	18,7
Umbria	7,4	7,7	76	224,0	167,0	135	15,7
Marche	7,4	8,1	75	205,3	157,9	100	18,5
Lazio	5,5	6,0	74	250,0	155,3	110	17,2
Abruzzo	6,7	7,4	74	203,4	144,2	84	17,3
Molise	5,2	6,2	75	181,9	142,8	80	18,5
Campania	4,9	5,7	72	217,2	145,6	86	15,7
Puglia	5,3	5,9	75	253,0	166,7	140	14,8
Basilicata	6,0	7,5	74	223,6	150,1	90	17,2
Calabria	5,3	6,0	73	205,6	135,4	76	21,3
Sicilia	4,8	5,4	74	231,0	147,1	84	21,6
Sardegna	5,9	6,3	75	213,0	159,6	119	15,7
Italia	5,7	6,0	75	236,2	156,2	120	15,9
Nord	5,8	5,8	75	253,1	162,6	132	13,8
Centro	6,3	6,8	75	218,2	151,2	100	17,8
Sud e Isole	5,2	5,9	74	224,4	150,4	96	17,6

Tabella 3.5.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci anticoagulanti nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*												
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=71.769						Nord^ N=35.418					
45-54 anni	5,1	6,6	7,9	8,6	7,9	-8	4,0	4,7	5,5	5,8	6,7	16
55-64 anni	5,5	5,5	9,5	8,6	7,9	-8	4,3	4,3	6,4	7,0	6,5	-7
65-74 anni	5,4	5,7	8,9	8,8	8,2	-7	4,2	4,6	6,2	6,6	7,1	8
75-84 anni	8,2	8,6	10,3	9,0	9,2	2	7,6	7,6	8,5	7,4	7,9	7
≥85 anni	14,2	14,5	14,5	12,9	12,2	-5	13,5	13,5	13,6	12,3	11,0	-11
Femmine	9,1	9,2	10,0	9,3	8,7	-6	8,3	8,3	8,6	8,4	7,9	-6
Maschi	7,5	7,3	10,7	10,0	9,8	-2	6,6	6,2	8,0	7,9	8,3	5
Totale	8,3	8,2	10,4	9,7	9,3	-4	7,4	7,2	8,3	8,1	8,1	0
	Centro N=16.848						Sud N=22.726					
45-54 anni	7,4	8,6	7,6	7,7	9,1	18	5,2	8,1	12,1	13,3	8,8	-34
55-64 anni	6,4	6,4	10,7	7,9	7,4	-6	6,6	6,5	13,1	11,3	10,1	-11
65-74 anni	6,2	6,5	11,5	8,6	8,9	3	6,2	6,5	11,4	11,8	9,3	-21
75-84 anni	8,6	8,7	11,8	8,4	9,4	12	9,1	10,3	12,5	12,1	11,1	-8
≥85 anni	15,5	15,4	14,8	11,2	12,7	13	14,3	15,2	16,0	15,3	14,0	-8
Femmine	10,5	10,3	11,2	8,5	8,7	2	9,3	9,7	11,4	11,4	9,9	-13
Maschi	8,1	8,0	12,6	9,4	10,6	13	8,3	8,6	14,1	13,7	11,7	-15
Totale	9,3	9,1	11,9	9,0	9,7	8	8,8	9,2	12,8	12,6	10,9	-13
segue												

segue

Tabella 3.5.1.s2 - continua

Alta aderenza*														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=71.769							Nord^ N=35.418						
45-54 anni	62,7	64,0	62,1	58,6	61,9	6		63,5	65,5	64,3	60,5	62,6	3	
55-64 anni	66,1	69,8	64,5	64,3	65,6	2		66,1	70,1	67,3	65,7	66,9	2	
65-74 anni	67,2	68,8	64,8	64,9	67,4	4		68,3	70,5	67,3	67,7	68,3	1	
75-84 anni	50,1	49,5	47,5	51,5	52,7	2		51,9	51,8	49,9	54,0	54,3	1	
≥85 anni	25,9	24,2	24,5	26,6	25,9	-3		27,9	25,3	25,7	28,9	27,7	-4	
Femmine	47,9	49,4	47,6	47,2	48,1	2		48,4	49,8	48,7	48,3	48,2	0	
Maschi	55,8	58,8	55,1	55,8	57,7	3		57,5	60,8	57,8	58,7	59,4	1	
Totale	52,0	54,3	51,6	51,8	53,2	3		53,2	55,7	53,6	53,9	54,3	1	
	Centro N=16.848							Sud N=22.726						
45-54 anni	60,8	59,3	60,3	60,4	60,1	0		62,6	65,0	59,7	54,9	62,0	13	
55-64 anni	64,2	68,8	62,7	65,5	65,6	0		67,2	69,9	61,5	61,7	63,8	3	
65-74 anni	65,4	67,0	61,7	65,5	67,2	3		66,9	67,7	62,8	60,7	66,1	9	
75-84 anni	48,8	48,8	46,4	52,8	54,2	3		48,1	46,3	43,7	46,2	49,1	6	
≥85 anni	25,4	24,3	23,7	26,4	26,7	1		23,3	22,2	22,8	22,7	22,0	-3	
Femmine	46,1	47,0	44,7	46,8	48,6	4		48,6	50,7	47,9	46,0	47,7	4	
Maschi	53,4	56,6	53,1	56,0	57,3	2		55,0	57,3	51,8	50,8	55,2	9	
Totale	49,8	52,0	49,1	51,7	53,2	3		51,8	54,0	49,9	48,5	51,6	6	

*L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023.

† Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata. Tempo mediano (IQR) di follow-up: 335 (301-351).

Δ Esclusa Valle d'Aosta.

Tabella 3.5.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con anticoagulanti nella popolazione di età ≥45 anni e nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=71.769							Nord^ N=34.565						
45-54 anni	56,1	57,7	56,4	55,9	54,9	-2		54,7	54,9	54,0	52,7	51,2	-3	
55-64 anni	62,6	65,6	63,4	64,1	63,5	-1		60,8	62,0	61,6	60,7	59,7	-2	
65-74 anni	68,8	71,3	70,0	70,8	70,8	0		68,6	70,3	69,2	69,5	67,9	-2	
75-84 anni	64,9	67,5	66,3	69,3	69,1	0		64,0	65,7	64,9	67,5	66,4	-2	
≥85 anni	53,8	57,5	58,1	62,3	61,5	-1		52,3	52,5	54,5	57,7	56,5	-2	
Femmine	62,3	65,6	64,9	67,0	66,6	-1		60,7	62,4	62,8	64,1	62,5	-2	
Maschi	63,8	66,7	65,2	67,0	66,5	-1		63,2	65,0	63,7	64,8	63,7	-2	
Totale	63,1	66,2	65,1	67,0	66,6	-1		62,0	63,8	63,3	64,5	63,1	-2	
	Centro N=14.666							Sud N=22.538						
45-54 anni	56,7	58,1	59,3	58,1	55,8	-4		57,8	61,4	58,5	59,3	59,9	1	
55-64 anni	59,9	66,4	62,3	67,1	66,3	-1		66,4	69,7	66,6	66,9	66,9	0	
65-74 anni	64,6	70,5	69,4	74,0	71,8	-3		71,7	73,1	71,6	70,4	74,1	5	
75-84 anni	61,2	69,3	68,4	74,0	72,1	-3		68,9	69,2	67,3	68,6	71,4	4	
≥85 anni	51,8	62,1	62,5	70,2	65,8	-6		57,6	61,7	61,3	63,0	67,0	6	
Femmine	58,6	66,8	66,3	71,8	70,1	-2		66,7	69,2	67,3	67,8	70,4	4	
Maschi	60,7	67,9	66,5	71,6	68,4	-5		66,9	68,7	67,0	67,0	69,8	4	
Totale	59,7	67,3	66,4	71,7	69,2	-3		66,8	69,0	67,1	67,4	70,1	4	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).

^ Esclusa Valle d'Aosta.

3.5.3 ANTIAGGREGANTI

Tabella 3.5.3.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci antiaggreganti per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	10,4	8,4	9,4	75	31,7	276,7	300	2,6
Valle d'Aosta	8,4	7,2	7,8	76	30,0	273,8	300	2,0
Lombardia	7,0	5,4	6,2	76	60,9	260,6	270	2,7
PA Bolzano	5,6	4,5	5,0	77	43,9	269,9	300	2,3
PA Trento	9,1	8,1	8,6	75	41,2	289,5	300	2,2
Veneto	6,7	4,5	5,6	75	38,5	280,8	300	2,4
Friuli VG	9,4	7,9	8,7	76	29,2	285,2	300	2,1
Liguria	7,8	7,8	7,8	78	32,0	248,9	280	4,6
Emilia R.	10,4	9,1	9,8	75	26,4	282,2	300	2,2
Toscana	10,7	9,2	9,9	76	52,9	277,3	300	5,2
Umbria	10,5	8,5	9,5	77	31,0	283,2	300	4,3
Marche	11,9	10,0	10,9	76	36,6	282,7	300	2,8
Lazio	10,9	9,9	10,4	75	59,0	274,7	300	3,2
Abruzzo	12,7	11,6	12,1	75	52,5	259,2	300	4,6
Molise	13,3	12,2	12,7	74	26,2	262,8	300	3,7
Campania	11,1	10,0	10,6	73	42,4	248,5	270	6,0
Puglia	12,2	10,5	11,3	74	52,6	277,0	300	3,4
Basilicata	13,2	12,2	12,7	74	59,2	272,8	300	5,0
Calabria	12,4	11,8	12,1	74	59,9	266,4	300	5,2
Sicilia	10,7	10,3	10,5	75	29,3	268,5	300	4,5
Sardegna	9,6	8,8	9,2	75	31,8	283,9	300	3,3
Italia	9,8	8,5	9,1	75	44,4	270,5	300	3,7
Nord	8,2	6,6	7,4	76	40,7	272,5	300	2,6
Centro	10,9	9,6	10,3	76	52,3	277,2	300	3,8
Sud e Isole	11,4	10,5	10,9	74	43,5	265,0	300	4,7

Tabella 3.5.3.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci antiaggreganti nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza *									
2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	Δ % 24-23
Totale N=160.407						Nord N=60.436			
45-54 anni	7,3	6,6	6,5	6,2	6,3	2	4,5	4,4	14
55-64 anni	7,4	6,6	6,6	6,6	6,3	-5	4,7	4,3	-2
65-74 anni	7,4	6,7	6,9	6,5	6,6	2	5,0	4,4	2
75-84 anni	8,0	7,4	7,4	7,1	7,3	3	6,0	5,7	0
≥85 anni	8,3	8,4	8,0	7,5	7,7	3	5,9	6,2	-2
Femmine	8,4	7,8	7,7	7,3	7,5	3	6,0	5,7	4
Maschi	6,9	6,2	6,4	6,3	6,2	-2	4,7	4,4	0
Totale	7,7	7,0	7,0	6,8	6,8	0	5,3	5,1	0
Centro N=33.446						Sud N=66.525			
45-54 anni	7,3	5,7	6,5	5,7	5,4	-5	9,5	8,2	-4
55-64 anni	6,9	5,2	6,0	5,3	5,4	2	9,9	9,1	-9
65-74 anni	7,5	5,6	6,4	6,1	6,2	2	9,3	9,0	-1
75-84 anni	8,3	6,6	7,3	7,1	6,7	-6	10,3	9,5	8
≥85 anni	9,5	8,0	8,8	7,4	8,4	14	10,6	10,1	0
Femmine	8,4	6,8	7,3	6,8	7,0	3	10,7	9,6	1
Maschi	7,3	5,2	6,3	5,9	5,8	-2	9,0	8,5	-2
Totale	7,8	6,0	6,8	6,3	6,4	2	9,8	9,0	0

segue

Tabella 3.5.3.s2 - continua

Alta aderenza*													
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=160.407						Nord N=60.436						
45-54 anni	62,8	63,3	64,4	64,4	65,2	1	69,9	69,8	70,0	70,4	69,3	-2	
55-64 anni	61,8	62,3	63,6	64,6	64,2	-1	68,9	68,1	68,7	69,7	69,2	-1	
65-74 anni	60,1	60,9	61,7	62,9	62,4	-1	65,5	65,6	66,1	68,0	66,6	-2	
75-84 anni	58,2	58,4	58,7	60,0	60,1	0	62,3	61,6	62,1	64,0	63,8	0	
≥85 anni	56,4	55,9	56,1	58,1	57,5	-1	60,8	58,8	59,8	61,5	61,0	-1	
Femmine	56,8	57,3	58,1	59,1	58,7	-1	61,8	61,5	61,8	63,6	62,5	-2	
Maschi	62,5	63,2	64,0	64,8	64,7	0	67,7	67,4	68,2	69,0	68,5	-1	
Totale	59,7	60,4	61,1	62,0	61,8	0	64,9	64,6	65,1	66,4	69,3	4	
	Centro N=33.446						Sud N=66.525						
45-54 anni	61,3	63,8	64,9	65,7	66,9	2	57,7	57,6	59,5	58,9	61,1	4	
55-64 anni	61,3	63,6	65,5	66,8	65,6	-2	56,2	56,7	58,8	59,1	59,6	1	
65-74 anni	60,1	62,0	63,1	64,1	64,2	0	55,6	56,1	57,1	58,0	58,4	1	
75-84 anni	56,9	59,6	58,9	60,4	59,5	-1	54,1	53,5	54,5	55,0	56,3	2	
≥85 anni	54,3	56,2	53,8	59,0	57,0	-3	52,0	51,8	53,1	53,1	53,5	1	
Femmine	56,2	58,4	59,3	60,3	59,7	-1	52,5	52,8	54,0	54,3	55,0	1	
Maschi	61,6	64,1	64,3	65,8	65,3	-1	57,9	58,2	59,7	59,9	60,7	1	
Totale	58,9	61,4	61,8	63,1	62,5	-1	55,2	55,5	56,8	57,1	57,9	1	

*L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023.

+ Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up: 322 (262-345).

Tabella 3.5.3.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci antiaggreganti nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=160.407							Nord N=60.436						
45-54 anni	54,0	55,0	55,8	55,8	56,2	1		60,4	59,9	59,9	59,9	58,6	-2	
55-64 anni	54,7	55,8	55,9	57,2	56,7	-1		60,5	60,2	58,9	60,8	59,3	-2	
65-74 anni	52,8	54,1	54,1	56,0	55,3	-1		56,7	56,6	56,4	58,3	56,4	-3	
75-84 anni	49,5	49,9	50,1	51,5	51,4	0		52,1	51,8	51,6	53,1	52,0	-2	
≥85 anni	47,2	47,1	46,6	48,8	48,8	0		50,4	48,2	48,3	50,3	50,1	-1	
Femmine	48,5	49,6	49,9	51,2	50,9	-1		52,0	51,8	51,3	53,1	51,8	-3	
Maschi	54,9	55,9	55,8	57,0	56,5	-1		58,6	58,6	58,3	59,1	57,7	-2	
Totale	51,7	52,8	52,9	54,2	53,8	-1		55,4	55,4	55,0	56,3	54,9	-2	
	Centro N=33.446							Sud N=66.525						
45-54 anni	51,8	54,9	56,8	57,6	58,4	1		49,9	50,9	51,8	51,5	53,2	3	
55-64 anni	53,9	58,0	57,7	60,4	59,7	-1		50,4	50,6	52,7	52,5	53,1	1	
65-74 anni	52,3	56,9	56,6	58,4	58,4	0		49,9	49,9	50,9	53,0	53,2	0	
75-84 anni	48,6	51,3	51,1	53,0	52,7	-1		46,9	46,5	47,6	48,7	49,9	2	
≥85 anni	44,5	49,1	45,5	49,6	49,3	-1		44,7	44,1	45,2	46,1	46,9	2	
Femmine	47,4	51,2	51,9	53,4	53,3	0		45,8	46,4	47,6	48,3	49,0	1	
Maschi	53,8	58,2	56,8	58,9	58,6	-1		51,8	51,5	52,8	53,8	54,4	1	
Totale	50,6	54,9	54,4	56,2	56,0	0		48,8	48,9	50,2	51,0	51,7	1	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici)

3.6.2 ANTIDEPRESSIVI

Tabella 3.6.2.s1 Esposizione e durata di terapia di antidepressivi per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	5,4	11,1	8,3	68	99,5	240,9	196,0	10,7
Valle d'Aosta	4,2	9,1	6,7	69	106,2	234,2	182,0	8,7
Lombardia	4,1	8,7	6,4	66	100,4	241,8	196,0	8,6
PA Bolzano	4,8	9,2	7,0	67	120,0	264,5	213,8	10,4
PA Trento	4,1	8,8	6,5	66	107,6	247,5	193,8	10,8
Veneto	4,2	8,8	6,5	68	106,5	245,5	196,0	11,3
Friuli VG	3,7	8,7	6,3	68	100,3	226,1	180,0	10,9
Liguria	6,3	13,5	10,0	70	100,5	228,6	180,0	12,6
Emilia R.	5,0	10,5	7,8	68	99,2	240,1	196,0	10,6
Toscana	6,5	13,9	10,3	69	97,5	244,1	199,5	13,0
Umbria	5,4	11,9	8,8	70	98,1	235,7	205,5	12,4
Marche	5,1	10,1	7,6	69	108,0	241,3	196,0	10,7
Lazio	4,1	8,6	6,4	66	108,4	236,3	190,7	10,8
Abruzzo	4,5	9,4	7,0	67	113,5	232,2	180,0	12,8
Molise	4,0	8,3	6,2	68	110,0	239,3	182,0	11,3
Campania	3,7	7,1	5,4	66	111,5	235,5	180,0	12,8
Puglia	4,1	7,8	6,0	67	108,0	232,0	180,0	12,4
Basilicata	4,0	8,0	6,0	67	106,1	227,7	180,0	13,6
Calabria	4,6	8,9	6,8	66	105,9	232,0	180,0	14,1
Sicilia	3,9	7,9	5,9	67	107,9	228,7	180,0	14,3
Sardegna	4,3	10,4	7,4	66	118,4	262,7	224,0	10,2
Italia	4,5	9,3	6,9	67	104,4	239,0	194,0	11,4
Nord	4,6	9,6	7,2	67	101,5	240,8	196,0	10,3
Centro	5,1	10,7	7,9	68	103,1	240,0	196,0	11,8
Sud e Isole	4,0	8,0	6,1	67	110,1	235,1	180,0	12,9

Tabella 3.6.2.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con antipertensivi nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=125.964							Nord N=59.285						
45-54 anni	21,9	22,3	22,4	23,0	23,1	1		20,5	21,6	20,9	22,4	21,5	-4	
55-64 anni	22,2	22,0	23,2	22,1	23,6	6		21,3	20,7	21,6	21,3	22,1	4	
65-74 anni	24,6	23,7	24,7	23,8	24,4	2		23,3	22,6	23,1	22,5	24,1	7	
75-84 anni	30,4	30,5	30,9	30,1	29,8	-1		29,6	30,3	30,9	29,3	29,3	0	
≥85 anni	44,6	45,6	45,7	43,7	43,8	0		45,5	45,6	45,4	44,3	45,2	2	
Femmine	28,0	27,2	28,1	27,7	28,6	3		27,5	26,9	27,2	27,2	28,4	4	
Maschi	26,9	26,5	27,0	27,1	26,9	-1		25,8	25,6	26,1	26,8	26,5	-1	
Totale	27,6	27,0	27,7	27,5	28,1	2		27,0	26,5	26,8	27,1	27,7	2	
	Centro N=28.266							Sud N=38.413						
45-54 anni	22,1	21,8	23,6	22,9	24,9	9		23,8	23,7	24,0	22,9	24,3	6	
55-64 anni	22,1	22,2	23,7	21,4	24,9	15		23,6	23,5	25,1	23,9	24,8	4	
65-74 anni	23,9	23,3	24,5	24,1	24,4	1		26,7	25,4	27,1	25,3	24,9	-1	
75-84 anni	29,9	29,0	29,8	31,1	29,8	-4		32,3	32,3	31,7	30,5	30,4	0	
≥85 anni	43,4	47,0	45,0	44,2	44,1	0		44,2	44,3	46,9	42,2	40,9	-3	
Femmine	27,5	26,8	28,2	28,3	29,3	3		29,3	28,1	29,4	28,1	28,5	1	
Maschi	27,4	26,9	27,3	27,9	28,1	1		28,0	27,6	28,1	27,0	26,9	0	
Totale	27,4	26,9	27,9	28,2	28,9	3		28,9	27,9	29,0	27,7	28,0	1	
segue														

segue

Tabella 3.6.2.s2 - continua

Alta aderenza*													
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=125.964							Nord N=59.285					
45-54 anni	42,6	43,4	42,4	43,2	43,5	1	45,1	44,6	44,6	44,8	45,5	2	
55-64 anni	41,6	42,7	41,9	42,6	42,0	-1	44,1	45,1	44,2	44,3	44,0	-1	
65-74 anni	39,3	40,6	39,8	40,2	40,3	0	41,0	42,5	41,6	41,8	41,1	-2	
75-84 anni	34,3	34,8	33,6	35,1	34,8	-1	35,8	36,0	34,0	35,8	35,7	0	
≥85 anni	25,0	24,4	24,4	25,9	25,9	0	25,2	25,1	24,4	26,0	26,0	0	
Femmine	36,4	37,7	36,8	37,2	36,7	-1	38,0	39,0	37,9	38,0	37,5	-1	
Maschi	39,0	40,0	39,3	39,6	40,0	1	40,7	41,5	40,9	41,1	41,4	1	
Totale	37,2	38,5	37,6	38,0	37,8	-1	38,9	39,85	38,9	39,0	38,8	-1	
	Centro N=28.266							Sud N=38.413					
45-54 anni	40,9	42,5	39,8	41,4	42,2	2	39,8	42,1	40,9	42,2	41,3	-2	
55-64 anni	39,6	41,9	40,5	43,4	39,9	-9	39,5	40,1	39,7	39,5	40,6	3	
65-74 anni	39,2	40,1	39,8	40,9	41,0	0	37,1	38,4	37,3	37,8	38,8	3	
75-84 anni	34,6	34,6	34,6	34,6	33,8	-2	31,6	32,6	32,2	34,2	34,1	0	
≥85 anni	25,2	22,6	25,7	25,8	24,8	-4	24,4	24,8	23,1	25,8	26,7	4	
Femmine	35,7	36,6	36,2	37,1	35,5	-5	34,4	36,5	35,3	36,1	36,3	1	
Maschi	38,0	39,7	38,5	39,0	39,1	0	37,1	37,9	37,4	37,8	38,5	2	
Totale	36,5	37,6	37,0	37,8	36,7	-3	35,3	37,0	36,0	36,7	37,1	1	

* L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023.

Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up: 309 (198-343).

Tabella 3.6.2.s3 Persistenza a un anno al trattamento con antidepressivi nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=125.964							Nord N=59.285						
45-54 anni	35,6	36,1	35,8	37,0	38,1	3		37,2	37,1	37,0	37,7	39,1	4	
55-64 anni	33,9	34,9	34,5	35,9	35,9	0		35,9	36,7	35,8	37,1	37,4	1	
65-74 anni	32,4	33,7	33,1	34,6	34,7	0		33,3	34,7	34,0	35,2	34,1	-3	
75-84 anni	31,1	31,6	30,9	32,8	32,7	0		31,5	32,0	30,3	32,8	32,2	-2	
≥85 anni	26,2	26,0	25,9	28,1	28,6	2		25,5	26,0	25,5	27,8	27,2	-2	
Femmine	32,1	32,9	32,4	33,8	33,7	0		32,7	33,4	32,5	34,0	33,4	-2	
Maschi	32,4	33,5	33,1	34,4	35,1	2		33,9	35,0	34,2	35,2	35,5	1	
Totale	32,2	33,1	32,6	34,0	34,2	1		33,1	33,9	33,1	34,4	34,1	-1	
	Centro N=28.266							Sud N=38.413						
45-54 anni	34,7	36,2	34,6	37,1	38,5	4		33,9	34,5	34,7	35,8	36,3	2	
55-64 anni	32,8	35,0	34,6	37,2	35,6	-5		32,0	32,3	32,5	33,1	34,0	3	
65-74 anni	33,0	34,5	34,8	35,6	35,9	1		30,8	31,6	30,8	33,2	34,6	5	
75-84 anni	31,5	32,6	31,9	33,2	33,6	1		29,9	30,3	31,1	32,4	32,8	1	
≥85 anni	27,2	24,7	27,4	28,4	30,3	7		26,3	27,3	25,4	28,3	29,9	6	
Femmine	32,4	33,2	33,1	34,7	34,5	0		30,9	31,9	31,5	32,7	33,7	3	
Maschi	31,5	33,7	33,1	34,5	35,6	3		30,7	31,1	31,6	33,2	34,0	3	
Totale	32,1	33,4	33,1	34,6	34,9	1		30,9	31,7	31,5	32,9	33,8	3	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).

3.6.3 ANTIEPILETTICI

Tabella 3.6.3.s1 Esposizione e durata di terapia di antiepilettici per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	1,7	1,9	1,8	61	279,5	202,7	132,0	7,5
Valle d'Aosta	1,5	1,5	1,5	60	288,2	211,9	144,0	5,3
Lombardia	1,5	1,6	1,5	59	295,7	189,4	120,0	6,8
PA Bolzano	1,3	1,3	1,3	59	372,8	231,3	160,0	7,1
PA Trento	1,6	1,8	1,7	61	276,9	193,1	120,0	10,3
Veneto	1,4	1,4	1,4	58	340,5	228,9	160,0	6,2
Friuli VG	1,3	1,5	1,4	61	353,3	245,0	174,0	6,4
Liguria	2,1	2,5	2,3	61	232,1	166,4	106,7	8,8
Emilia R.	1,5	1,8	1,7	61	146,9	171,7	102,7	10,4
Toscana	2,4	2,7	2,6	61	121,1	155,4	94,0	10,0
Umbria	1,9	2,1	2,0	63	262,7	198,2	121,3	8,7
Marche	2,1	2,2	2,2	62	296,9	203,6	130,7	7,5
Lazio	2,3	2,5	2,4	59	241,8	169,1	100,0	8,0
Abruzzo	2,2	2,3	2,3	61	277,4	184,0	110,0	10,4
Molise	2,2	2,4	2,3	61	232,1	177,3	106,0	8,0
Campania	2,0	2,1	2,1	58	288,0	195,5	120,0	8,8
Puglia	2,1	2,2	2,1	60	261,6	187,8	120,0	8,5
Basilicata	2,3	2,4	2,4	61	252,0	182,6	120,0	9,3
Calabria	2,4	2,6	2,5	60	252,3	176,4	105,0	10,9
Sicilia	2,4	2,4	2,4	60	247,2	174,7	105,0	9,7
Sardegna	2,3	2,8	2,5	60	221,2	169,0	108,0	9,1
Italia	1,9	2,1	2,0	60	252,9	184,9	120,0	8,5
Nord	1,5	1,7	1,6	60	272,7	195,9	125,0	7,7
Centro	2,3	2,5	2,4	60	209,0	170,2	100,0	8,7
Sud e Isole	2,2	2,3	2,3	60	260,5	183,1	112,0	9,3

3.6.4 TERAPIA DEL DOLORE

Tabella 3.6.4.s1 Esposizione e durata di terapia dei farmaci per la terapia del dolore per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	5,6	8,5	7,0	70	95,4	48,1	11,3	32,9
Valle d'Aosta	4,6	7,0	5,8	72	121,1	58,0	16,0	25,1
Lombardia	4,0	6,3	5,2	71	124,2	56,6	16,0	27,1
PA Bolzano	3,0	4,6	3,8	73	127,9	59,5	15,2	28,9
PA Trento	4,4	6,6	5,5	70	113,5	50,3	10,7	31,2
Veneto	3,1	5,1	4,1	73	129,9	60,8	16,0	30,0
Friuli VG	4,2	6,7	5,5	73	146,7	60,5	15,2	26,6
Liguria	5,3	8,3	6,8	73	99,5	48,9	14,0	33,1
Emilia R.	4,7	7,5	6,1	70	87,5	47,9	11,3	33,4
Toscana	4,8	7,8	6,3	72	77,3	45,4	11,7	34,5
Umbria	4,1	6,6	5,4	73	101,9	47,5	11,7	32,0
Marche	3,9	6,3	5,2	72	97,9	46,9	11,7	34,8
Lazio	4,0	6,5	5,3	70	107,5	52,0	15,6	27,8
Abruzzo	3,7	6,0	4,9	71	110,5	46,8	12,4	34,3
Molise	3,7	6,3	5,0	71	95,1	40,1	10,7	35,1
Campania	3,7	6,2	5,0	69	86,0	39,1	10,7	36,3
Puglia	4,8	7,8	6,3	70	89,9	38,8	10,7	36,2
Basilicata	4,7	7,8	6,2	70	81,3	39,0	10,7	37,3
Calabria	3,7	5,7	4,7	71	89,1	40,1	11,3	37,8
Sicilia	3,7	6,0	4,9	71	100,0	43,7	12,0	36,1
Sardegna	4,1	6,9	5,5	70	134,2	56,1	14,9	29,4
Italia	4,2	6,7	5,4	71	103,2	48,8	14,0	32,2
Nord	4,3	6,7	5,5	71	111,7	53,5	14,0	30,2
Centro	4,2	6,9	5,6	71	95,3	48,8	14,0	31,3
Sud e Isole	4,0	6,5	5,3	70	95,7	42,0	11,2	35,7

3.6.5 ANTIPSICOTICI

Tabella 3.6.5.s1 Esposizione e durata di terapia di antipsicotici per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	1,5	1,9	1,7	67	43,2	122,6	49,0	11,6
Valle d'Aosta	1,4	1,9	1,6	64	44,9	123,8	56,0	9,4
Lombardia	1,7	2,1	1,9	66	221,4	117,5	50,5	9,2
PA Bolzano	1,3	1,7	1,5	63	107,9	101,1	45,4	14,1
PA Trento	1,5	1,7	1,6	63	82,3	124,7	56,0	11,2
Veneto	1,2	1,5	1,3	62	99,9	131,3	60,0	11,2
Friuli VG	1,2	1,7	1,5	77	61,3	79,8	31,7	12,9
Liguria	1,8	2,5	2,2	71	40,8	96,4	40,0	15,7
Emilia R.	1,2	1,6	1,4	65	52,4	110,5	48,0	13,8
Toscana	1,9	2,4	2,1	67	82,4	102,7	45,0	14,6
Umbria	1,5	2,1	1,8	76	40,8	84,7	39,4	14,6
Marche	1,9	2,3	2,1	68	66,1	126,4	56,2	11,6
Lazio	2,0	2,5	2,2	65	74,7	134,1	56,0	9,8
Abruzzo	2,2	2,5	2,4	68	174,4	125,8	54,8	12,5
Molise	1,9	2,4	2,2	69	79,6	127,4	48,6	12,8
Campania	1,7	1,8	1,7	64	104,1	146,9	60,0	11,2
Puglia	2,0	2,2	2,1	65	145,2	154,1	70,0	10,3
Basilicata	2,1	2,4	2,3	65	167,7	148,8	72,0	11,4
Calabria	2,0	2,2	2,1	63	112,3	145,9	65,6	12,8
Sicilia	2,0	2,2	2,1	65	64,0	156,0	70,0	11,1
Sardegna	2,7	3,5	3,1	66	114,9	138,5	58,1	10,2
Italia	1,7	2,1	1,9	66	109,5	128,9	56,0	11,3
Nord	1,5	1,8	1,7	66	128,1	116,2	49,0	11,3
Centro	1,9	2,4	2,2	67	73,9	120,5	50,6	11,8
Sud e Isole	2,0	2,2	2,1	65	110,9	147,8	62,5	11,2

3.6.6 ANTIPARKINSON

Tabella 3.6.6.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci antiparkinson per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	0,9	0,8	0,8	78	347,1	250,8	125,0	7,3
Valle d'Aosta	0,7	0,7	0,7	77	453,6	286,0	150,0	5,7
Lombardia	0,6	0,6	0,6	77	444,1	260,1	133,3	5,7
PA Bolzano	0,6	0,7	0,7	77	251,5	174,8	75,0	9,6
PA Trento	0,6	0,5	0,6	75	375,4	261,1	141,7	6,7
Veneto	0,7	0,7	0,7	76	372,5	271,9	133,3	6,8
Friuli VG	0,6	0,7	0,6	78	388,9	272,3	133,3	6,8
Liguria	1,0	1,0	1,0	80	343,3	253,7	126,0	9,2
Emilia R.	0,7	0,7	0,7	78	214,1	212,6	112,0	7,4
Toscana	0,8	0,8	0,8	79	342,7	235,6	116,7	9,7
Umbria	0,9	0,9	0,9	80	361,6	241,3	125,0	8,4
Marche	0,9	1,0	1,0	78	359,3	253,4	127,4	7,7
Lazio	0,8	0,8	0,8	77	434,0	281,5	147,7	7,2
Abruzzo	1,0	1,0	1,0	78	385,1	244,8	120,0	8,2
Molise	0,9	0,9	0,9	76	304,5	241,6	140,0	8,5
Campania	0,8	0,7	0,8	77	323,3	248,2	130,0	9,4
Puglia	0,9	0,9	0,9	77	356,2	239,6	125,0	7,7
Basilicata	0,9	0,8	0,9	76	330,5	252,9	138,6	9,8
Calabria	0,9	0,8	0,8	73	295,8	246,3	120,0	10,3
Sicilia	1,0	0,9	0,9	76	282,7	242,7	133,3	9,4
Sardegna	0,8	0,8	0,8	73	354,9	249,9	140,0	8,5
Italia	0,8	0,8	0,8	77	353,7	250,8	130,0	7,9
Nord	0,7	0,7	0,7	77	362,4	251,5	127,0	6,9
Centro	0,8	0,8	0,8	78	389,2	260,0	133,3	8,1
Sud e Isole	0,9	0,8	0,9	76	323,4	244,8	130,0	9,0

3.6.7 ANTIEMICRANICI

Tabella 3.6.7.s1 Esposizione e durata di terapia di antiemcranici per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	0,3	1,2	0,8	51	149,0	48,5	24,0	21,2
Valle d'Aosta	0,3	1,1	0,7	51	167,6	51,5	24,0	16,0
Lombardia	0,2	1,0	0,6	51	146,8	46,0	24,0	18,9
PA Bolzano	0,3	1,1	0,7	50	130,5	39,9	24,0	20,6
PA Trento	0,3	1,1	0,7	51	151,4	50,8	24,0	18,6
Veneto	0,3	1,2	0,7	51	160,5	50,4	24,0	21,3
Friuli VG	0,3	1,2	0,8	51	164,5	50,1	24,0	18,9
Liguria	0,3	1,0	0,6	53	146,6	47,4	24,0	23,7
Emilia R.	0,3	1,3	0,8	50	164,1	51,5	24,0	21,3
Toscana	0,2	0,8	0,5	51	142,6	45,8	24,0	26,8
Umbria	0,2	0,7	0,5	52	147,4	45,5	24,0	26,3
Marche	0,3	1,1	0,7	51	140,6	45,5	24,0	23,8
Lazio	0,3	1,0	0,7	52	158,0	47,9	24,0	20,7
Abruzzo	0,2	0,9	0,6	52	142,4	44,6	18,0	27,7
Molise	0,2	0,8	0,5	51	160,6	47,9	24,0	22,9
Campania	0,3	0,8	0,5	51	139,5	42,8	18,0	25,9
Puglia	0,3	1,0	0,7	51	156,5	49,3	24,0	23,4
Basilicata	0,2	0,8	0,5	51	132,5	43,4	18,0	28,9
Calabria	0,3	0,9	0,6	53	128,1	39,7	16,0	29,6
Sicilia	0,3	0,9	0,6	52	148,2	46,1	24,0	26,9
Sardegna	0,3	1,2	0,8	51	192,6	56,4	30,0	20,1
Italia	0,3	1,0	0,7	51	151,9	47,5	24,0	22,5
Nord	0,3	1,1	0,7	51	153,6	48,5	24,0	20,4
Centro	0,3	0,9	0,6	52	150,7	46,9	24,0	23,1
Sud e Isole	0,3	0,9	0,6	52	149,9	46,3	24,0	25,5

3.6.8 FARMACI ANTIDEMENZA

Tabella 3.6.8.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci antidemenza per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	0,2	0,4	0,3	82	42,6	240,1	214,7	6,0
Valle d'Aosta	0,3	0,4	0,3	82	144,8	198,0	159,8	4,3
Lombardia	0,2	0,4	0,3	82	218,1	246,7	224,0	3,8
PA Bolzano	0,3	0,5	0,4	83	174,0	292,4	280,0	8,9
PA Trento	0,1	0,2	0,1	81	65,7	252,8	224,0	4,3
Veneto	0,3	0,4	0,3	82	66,6	251,3	224,0	5,8
Friuli VG	0,3	0,4	0,3	82	146,2	251,3	224,0	4,7
Liguria	0,4	0,7	0,6	83	68,0	250,8	205,3	8,8
Emilia R.	0,2	0,3	0,2	82	59,0	238,8	224,0	8,0
Toscana	0,3	0,6	0,4	83	57,4	238,6	210,0	9,2
Umbria	0,4	0,6	0,5	83	44,8	254,9	242,7	8,0
Marche	0,3	0,5	0,4	83	74,5	235,5	224,0	7,9
Lazio	0,3	0,5	0,4	82	67,6	233,6	196,0	9,4
Abruzzo	0,5	0,8	0,6	82	85,2	243,8	205,3	8,0
Molise	0,3	0,5	0,4	82	60,3	217,0	168,0	11,0
Campania	0,3	0,5	0,4	80	59,8	222,8	200,0	10,5
Puglia	0,3	0,5	0,4	80	101,9	235,7	196,0	8,5
Basilicata	0,3	0,5	0,4	81	176,2	256,9	242,7	8,4
Calabria	0,2	0,4	0,3	80	87,6	215,8	168,0	10,7
Sicilia	0,2	0,2	0,2	79	45,1	247,9	224,0	8,7
Sardegna	0,2	0,4	0,3	82	80,1	225,6	186,7	12,3
Italia	0,3	0,4	0,3	82	92,0	239,5	210,0	7,9
Nord	0,2	0,4	0,3	82	121,5	247,0	224,0	5,7
Centro	0,3	0,5	0,4	83	63,3	237,2	205,3	9,1
Sud e Isole	0,3	0,4	0,3	81	76,7	232,0	197,1	9,6

3.7.1 FARMACI PER ASMA E BPCO

Tabella 3.7.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci per asma e BPCO per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	9,1	9,8	9,4	53	178,5	109,6	30,0	40,0
Valle d'Aosta	9,8	10,6	10,2	51	123,0	95,2	30,0	41,9
Lombardia	10,3	11,1	10,7	48	137,3	93,9	30,0	42,3
PA Bolzano	9,8	10,3	10,0	41	100,4	76,9	25,0	46,9
PA Trento	13,5	14,4	14,0	45	106,5	77,8	25,0	44,9
Veneto	9,9	10,1	10,0	47	123,8	96,3	30,0	42,5
Friuli VG	10,0	10,8	10,4	54	134,3	103,1	30,0	42,7
Liguria	11,4	12,5	12,0	54	132,2	101,3	30,0	38,2
Emilia R.	12,7	14,0	13,3	48	98,5	78,7	30,0	45,8
Toscana	9,5	9,9	9,7	54	155,5	115,7	40,8	39,9
Umbria	10,0	10,5	10,3	54	133,5	98,8	30,0	44,9
Marche	10,7	11,1	10,9	50	145,5	97,7	30,0	47,1
Lazio	14,1	16,2	15,2	50	120,2	81,2	30,0	44,1
Abruzzo	12,2	13,4	12,8	50	134,7	82,2	30,0	50,2
Molise	12,1	13,3	12,7	54	113,3	79,2	30,0	49,3
Campania	16,0	17,7	16,9	48	129,7	85,3	30,0	42,0
Puglia	10,8	11,1	10,9	56	136,2	103,5	30,0	43,2
Basilicata	11,5	12,6	12,1	56	132,6	98,1	30,0	44,3
Calabria	11,4	12,2	11,8	55	126,6	84,8	30,0	46,8
Sicilia	12,1	13,1	12,6	55	115,1	88,8	30,0	46,5
Sardegna	13,1	15,4	14,3	53	115,1	91,8	30,0	46,5
Italia	11,6	12,6	12,1	51	129,4	91,8	30,0	43,6
Nord	10,5	11,3	10,9	49	131,0	93,5	30,0	42,6
Centro	11,9	13,2	12,6	51	132,3	92,4	30,0	43,5
Sud e Isole	12,9	14,1	13,5	52	126,1	89,5	30,0	44,7

Tabella 3.7.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci per asma e BPCO nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

	Bassa aderenza*										Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		

segue

Tabella 3.7.1.s2 - continua

Alta aderenza*													
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=201.687						Nord N=77.773						
45-54 anni	18,0	20,4	15,5	15,9	15,5	-3	19,1	22,9	17,1	17,1	15,7	-8	
55-64 anni	22,1	23,1	18,3	18,5	18,6	1	25,1	25,6	19,7	19,9	19,1	-4	
65-74 anni	24,2	25,2	20,3	21,2	20,7	-3	26,9	27,8	22,9	23,6	22,0	-7	
75-84 anni	25,9	27,0	22,9	23,3	22,2	-5	28,2	29,5	25,7	25,5	23,6	-8	
≥85 anni	25,3	25,2	21,8	22,5	20,6	-9	27,5	27,9	23,4	24,1	21,1	-12	
Femmine	22,0	22,2	18,2	18,9	18,0	-5	24,2	24,3	19,9	20,6	18,9	-8	
Maschi	24,7	26,8	21,3	22,0	21,7	-1	27,3	29,8	23,8	24,0	22,5	-6	
Totale	23,2	24,2	19,5	20,2	19,5	-3	25,6	26,8	21,5	22,0	20,37	-7	
	Centro N=41.916						Sud N=81.998						
45-54 anni	18,9	20,3	14,5	16,0	14,6	-9	16,9	19,0	14,7	14,9	15,6	5	
55-64 anni	22,5	24,3	18,7	19,0	18,7	-2	20,0	21,2	17,0	17,1	18,1	6	
65-74 anni	25,7	26,6	20,9	21,3	20,8	-2	21,9	23,2	18,2	19,1	19,5	2	
75-84 anni	27,6	28,8	24,5	24,0	22,6	-6	23,4	24,5	19,9	20,9	20,7	-1	
≥85 anni	26,4	26,5	23,3	24,1	21,3	-12	23,1	22,8	19,7	20,0	19,6	-2	
Femmine	23,4	23,2	19,0	19,4	18,1	-7	19,9	20,5	16,6	17,2	17,1	-1	
Maschi	25,8	28,6	21,6	22,5	21,8	-3	22,5	24,2	19,2	20,0	21,0	5	
Totale	24,4	25,5	20,0	20,6	19,6	-5	21,0	22,2	17,7	18,3	18,7	2	

* L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023. Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.

Tempo mediano (IQR) di follow-up:224 (100-327).

Tabella 3.7.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci per asma e BPCO nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

	Persistenza a 12 mesi						
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	Δ % 24-23
	Totale N=201.687						
45-54 anni	6,5	8,1	5,0	4,6	5,3	16	
55-64 anni	9,2	9,9	6,8	6,5	7,3	12	
65-74 anni	11,0	12,3	8,5	8,4	9,6	14	
75-84 anni	12,3	13,5	10,8	9,6	10,6	10	
≥85 anni	10,8	12,9	8,9	8,0	8,6	7	
Femmine	8,2	9,4	6,3	5,9	6,6	12	
Maschi	12,6	13,7	10,1	9,8	10,8	11	
Totale	10,1	11,3	7,9	7,5	8,4	12	2
	Centro N=41.916						
45-54 anni	6,2	8,5	4,7	4,5	5,0	11	
55-64 anni	9,1	10,8	7,2	6,4	7,6	18	
65-74 anni	11,8	13,7	8,6	9,0	10,5	17	
75-84 anni	12,6	15,2	11,7	10,3	11,7	14	
≥85 anni	10,7	12,8	9,4	8,8	9,0	3	
Femmine	8,6	10,3	6,7	6,3	7,3	16	
Maschi	12,8	15,2	10,3	10,1	11,3	11	
Totale	10,3	12,4	8,2	7,8	8,9	14	21
	Sud N=81.998						
45-54 anni							
55-64 anni							
65-74 anni							
75-84 anni							
≥85 anni							
Femmine							
Maschi							
Totale							

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici)

3.8.1 FARMACI PER L'OSTEOPOROSI

Tabella 3.8.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci per l'osteoporosi per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	4,6	16,6	10,7	71	66,7	448,4	336,0	14,6
Valle d'Aosta	5,2	16,7	11,0	71	67,9	456,9	375,0	6,9
Lombardia	5,5	18,0	11,8	69	76,0	483,2	375,0	8,1
PA Bolzano	4,8	13,7	9,3	69	61,8	573,5	375,0	11,1
PA Trento	5,9	17,0	11,5	67	68,2	482,4	375,0	9,4
Veneto	4,1	13,4	8,8	70	74,0	550,6	375,0	15,1
Friuli VG	6,5	19,4	13,1	70	80,1	506,0	375,0	11,1
Liguria	4,5	17,2	11,1	73	74,0	415,1	300,0	14,4
Emilia R.	4,4	15,8	10,2	69	45,9	444,6	280,0	15,3
Toscana	3,1	11,6	7,4	71	66,3	392,0	250,0	26,6
Umbria	3,2	13,6	8,6	73	69,4	368,8	250,0	23,3
Marche	4,5	17,2	11,0	71	86,6	421,8	272,5	15,3
Lazio	4,5	17,4	11,1	70	84,4	373,0	250,0	15,9
Abruzzo	6,4	20,4	13,5	69	75,8	319,9	250,0	21,3
Molise	7,5	23,9	15,8	69	67,6	402,5	250,0	12,6
Campania	5,6	18,6	12,3	68	69,3	400,5	250,0	12,6
Puglia	6,0	20,5	13,4	70	66,5	369,6	250,0	19,2
Basilicata	6,1	23,2	14,7	68	72,9	398,6	250,0	15,9
Calabria	6,1	20,2	13,3	69	64,3	317,1	250,0	19,5
Sicilia	4,9	18,9	12,1	70	74,0	340,1	250,0	18,1
Sardegna	5,4	23,1	14,4	70	79,4	531,1	375,0	15,4
Italia	5,0	17,4	11,3	70	71,6	424,9	252,0	14,9
Nord	4,9	16,5	10,8	70	69,4	480,4	363,6	11,8
Centro	3,9	15,3	9,8	70	79,4	384,2	250,0	18,8
Sud e Isole	5,7	19,9	12,9	69	70,7	378,6	250,0	16,8

Tabella 3.8.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci per l'osteoporosi nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*												
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=52.731						Nord N=21.074					
45-54 anni	7,0	6,8	6,9	7,6	6,5	-16	4,9	5,2	4,7	5,7	5,2	-10
55-64 anni	6,1	6,4	6,8	6,1	5,7	-8	5,3	4,9	5,2	5,0	4,6	-10
65-74 anni	6,5	6,5	7,6	6,3	6,1	-3	5,1	5,4	6,2	4,7	4,7	0
75-84 anni	7,2	7,8	8,0	7,4	6,6	-12	5,9	6,4	6,9	5,7	5,1	-12
≥85 anni	8,1	9,9	9,6	9,5	7,4	-28	6,8	7,3	8,5	7,9	6,1	-29
Femmine	6,5	6,6	7,2	6,5	6,0	-9	5,3	5,4	5,8	5,2	4,8	-9
Maschi	9,4	11,4	11,5	10,2	8,9	-15	6,7	7,9	8,6	6,6	6,1	-9
Totale	6,8	7,0	7,5	6,9	6,2	-10	5,5	5,6	6,1	5,4	4,9	-9
	Centro N=10.419						Sud N=21.238					
45-54 anni	6,6	4,8	5,8	5,4	6,7	19	9,1	9,8	9,5	10,6	7,7	-37
55-64 anni	6,5	6,5	6,1	5,4	5,8	8	6,8	7,9	8,8	7,6	6,6	-15
65-74 anni	6,5	6,7	8,0	6,0	6,5	7	7,9	7,7	8,7	8,0	7,3	-10
75-84 anni	7,5	9,1	8,2	7,7	7,7	0	8,6	8,8	9,4	9,3	7,7	-20
≥85 anni	9,2	12,2	13,1	10,5	7,2	-45	9,0	11,3	8,8	10,9	9,1	-20
Femmine	6,7	6,9	7,3	6,4	6,5	2	7,6	7,8	8,5	7,9	6,9	-15
Maschi	10,5	12,0	11,0	8,4	9,1	8	12,6	15,7	15,4	15,8	12,6	-25
Totale	7,0	7,3	7,6	6,5	6,7	2	7,9	7,3	9,0	8,6	7,3	-16

segue

Tabella 3.8.1.s2 - continua

Alta aderenza *														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=52.731							Nord N=21.074						
45-54 anni	68,5	71,1	68,1	67,2	67,4	0		73,2	75,9	71,0	70,9	70,2	-1	
55-64 anni	68,7	70,6	68,6	68,7	69,7	1		71,5	74,2	72,5	72,2	72,9	1	
65-74 anni	68,0	69,5	67,5	68,9	69,3	1		72,0	73,3	70,3	73,5	72,7	-1	
75-84 anni	67,2	66,5	66,0	67,4	68,1	1		70,6	68,8	67,8	70,4	71,5	2	
≥85 anni	64,7	62,7	63,1	63,4	65,0	3		67,4	65,6	65,5	66,7	66,7	0	
Femmine	67,7	69,1	67,4	68,0	68,8	1		71,1	72,3	70,1	71,5	71,8	1	
Maschi	67,8	65,8	65,3	66,9	67,4	1		71,9	70,5	68,9	72,9	71,4	-2	
Totale	67,7	68,8	67,3	67,9	68,7	1,1		71,2	72,15	70,0	71,6	71,8	0	
	Centro N=10.419							Sud N=21.238						
45-54 anni	69,2	74,3	71,1	71,9	70,3	-2		63,7	64,1	63,5	61,2	63,3	3	
55-64 anni	69,6	71,3	70,8	71,4	72,3	1		65,6	66,6	63,8	64,1	65,5	2	
65-74 anni	68,2	68,9	67,7	67,8	70,4	4		64,4	66,0	64,6	64,9	65,7	1	
75-84 anni	66,9	66,4	66,8	67,3	67,8	1		63,4	63,4	63,2	63,8	64,3	1	
≥85 anni	63,0	62,9	59,3	61,0	66,1	8		62,5	59,6	62,3	60,6	62,3	3	
Femmine	67,9	69,6	68,1	68,6	70,0	2		64,4	65,4	64,3	64,3	65,3	1	
Maschi	67,6	64,1	69,2	67,2	69,6	3		62,5	60,2	58,4	58,9	61,0	3	
Totale	67,9	69,2	68,2	68,5	69,9	2		64,2	65,1	63,9	63,9	64,9	2	

*L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).
N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023. Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata.
Tempo mediano (IQR) di follow-up (in giorni): 316 (208-344).

Tabella 3.8.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci per l'osteoporosi nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

	Persistenza a 12 mesi										Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
45-54 anni	54,7	55,4	54,8	54,8	56,0	2	59,6	60,6	58,7	59,2	59,6	59,6	1				
55-64 anni	54,1	55,1	54,1	55,7	56,9	2	59,0	60,4	58,2	60,9	60,8	60,8	0				
65-74 anni	51,3	51,8	50,6	52,6	54,0	3	57,3	57,2	54,7	59,9	59,0	59,0	-2				
75-84 anni	48,7	48,0	48,3	49,8	51,0	3	53,2	52,1	51,7	54,6	55,0	55,0	1				
≥85 anni	43,7	41,8	43,0	44,3	46,2	4	48,9	48,6	48,1	49,8	50,1	50,1	1				
Femmine	51,2	52,3	51,7	52,8	54,2	3	56,2	57,1	55,5	58,2	58,3	58,3	0				
Maschi	47,1	42,8	42,5	46,1	46,8	1	53,8	50,4	47,6	54,3	52,3	52,3	-4				
Totale	50,9	51,5	51,0	52,2	53,6	3	55,9	56,5	54,7	57,8	57,7	57,7	0				
Centro N=10.419																	
45-54 anni	58,9	62,4	60,6	61,1	61,1	0	47,8	45,5	47,7	47,2	50,0	50,0	6				
55-64 anni	56,4	58,6	57,6	58,9	61,7	5	48,3	47,7	48,2	49,1	51,0	51,0	4				
65-74 anni	53,0	52,9	52,6	54,2	56,5	4	44,9	45,6	45,4	44,9	48,4	48,4	8				
75-84 anni	46,9	47,7	50,0	49,8	52,3	5	44,3	42,9	43,0	43,8	45,7	45,7	4				
≥85 anni	41,1	37,1	39,3	41,6	45,9	10	39,1	37,4	39,2	39,0	41,7	41,7	7				
Femmine	52,4	54,2	54,0	54,7	57,2	5	45,8	46,1	46,5	46,4	48,8	48,8	5				
Maschi	44,0	42,6	45,6	45,8	46,6	2	39,7	32,6	34,1	35,4	39,4	39,4	11				
Totale	51,7	53,3	53,4	54,1	56,5	4	45,4	45,1	45,6	45,6	48,1	48,1	6				
La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).																	

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici).

3.8.2 FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS)

Tabella 3.8.2.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)		Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine					
Piemonte	10,2	14,3	12,3	16,5	41,8	30,0	54,0
Valle d'Aosta	10,4	14,7	12,6	18,0	46,2	30,0	52,8
Lombardia	7,0	10,2	8,6	15,9	40,6	30,0	54,8
PA Bolzano	5,4	7,7	6,6	19,5	49,2	30,0	52,9
PA Trento	10,6	14,4	12,5	15,9	42,2	30,0	51,2
Veneto	6,7	9,7	8,2	17,3	43,2	30,0	54,8
Friuli VG	11,3	15,8	13,6	17,3	46,2	30,0	49,3
Liguria	10,3	14,0	12,2	15,7	38,1	22,5	57,4
Emilia R.	8,7	11,8	10,3	13,8	34,3	20,0	57,3
Toscana	8,6	11,4	10,1	13,3	33,3	20,0	59,2
Umbria	9,2	11,7	10,5	12,7	32,0	16,0	58,7
Marche	10,8	13,8	12,3	14,4	35,1	20,0	58,0
Lazio	16,2	21,3	18,9	15,5	39,8	26,7	49,9
Abruzzo	16,1	20,5	18,3	14,1	35,4	20,0	54,9
Molise	20,3	25,3	22,8	16,9	41,6	30,0	48,7
Campania	18,0	24,1	21,1	17,1	43,7	30,0	48,4
Puglia	18,7	23,8	21,3	16,0	39,8	30,0	47,6
Basilicata	19,3	25,0	22,2	15,8	39,8	30,0	49,9
Calabria	16,7	22,1	19,5	18,4	46,8	30,0	45,6
Sicilia	15,0	20,1	17,6	17,3	42,9	30,0	47,8
Sardegna	18,8	24,7	21,8	17,5	44,8	30,0	46,2
Italia	12,1	16,3	14,2	16,1	40,8	30,0	51,3
Nord	8,1	11,5	9,8	16,0	40,5	30,0	54,8
Centro	12,7	16,6	14,7	14,8	37,5	21,0	53,2
Sud e Isole	17,3	22,7	20,1	16,8	42,4	30,0	48,1

3.9.1 FARMACI PER LA TIROIDE

Tabella 3.9.1.s1 Esposizione e durata di terapia dei farmaci per la tiroide per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)		Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine					
Piemonte	2,2	9,7	66	26,6	156,5	141,7	5,5
Valle d'Aosta	1,8	8,2	68	24,8	154,1	133,3	4,0
Lombardia	1,5	6,4	65	29,5	157,3	141,7	4,8
PA Bolzano	1,8	7,6	67	23,4	162,9	150,0	3,3
PA Trento	2,5	10,8	62	30,1	168,8	150,0	2,7
Veneto	1,7	7,5	63	37,8	174,9	160,0	4,9
Friuli VG	2,4	10,7	65	28,0	166,8	150,0	3,6
Liguria	1,1	4,8	75	30,2	145,8	133,3	10,3
Emilia R.	2,5	10,7	65	24,9	169,4	150,0	3,7
Toscana	2,5	10,2	66	23,2	162,1	150,0	6,6
Umbria	3,0	12,2	65	28,0	167,2	150,0	6,0
Marche	2,5	10,4	66	24,3	166,4	150,0	5,6
Lazio	2,5	10,8	65	32,0	173,1	150,0	4,4
Abruzzo	2,3	9,4	65	27,7	163,4	150,0	7,4
Molise	2,9	12,1	64	30,8	168,1	150,0	5,8
Campania	1,8	7,2	63	29,6	157,4	133,3	7,9
Puglia	2,6	11,0	64	29,5	167,7	150,0	4,6
Basilicata	2,9	11,6	64	26,8	177,9	166,7	5,8
Calabria	2,2	8,7	66	29,6	168,6	150,0	7,9
Sicilia	1,8	8,1	66	32,3	171,3	158,3	7,0
Sardegna	2,1	10,3	66	31,6	186,5	175,0	4,6
Italia	2,1	8,8	65	29,2	166,1	150,0	5,5
Nord	1,9	8,0	65	29,1	163,2	150,0	4,8
Centro	2,5	10,7	65	28,1	168,5	150,0	5,3
Sud e Isole	2,1	8,9	64	30,1	167,9	150,0	6,5

3.10.1 FARMACI PER I DISTURBI GENITO-URINARI

Tabella 3.10.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci per i disturbi genito-urinari per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)	Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
Piemonte	4,6	75	96,5	323,7	320,0	5,9
Valle d'Aosta	4,1	75	92,5	302,9	300,0	7,3
Lombardia	4,0	74	97,5	329,8	320,0	6,3
PA Bolzano	2,9	76	87,3	291,6	300,0	8,5
PA Trento	4,0	75	109,6	349,0	338,0	7,9
Veneto	3,9	74	106,3	343,5	340,0	7,0
Friuli VG	4,1	76	105,6	347,2	340,0	5,4
Liguria	5,1	76	102,7	333,0	320,0	7,2
Emilia R.	4,5	75	104,1	339,5	330,0	6,6
Toscana	4,9	75	96,9	327,3	320,0	10,0
Umbria	5,3	75	108,5	351,8	340,0	7,5
Marche	5,5	74	113,7	362,6	360,0	7,3
Lazio	4,8	73	106,8	336,1	326,0	6,8
Abruzzo	4,8	74	100,8	327,4	320,0	8,5
Molise	5,0	74	104,0	322,3	320,0	7,1
Campania	5,1	72	105,8	324,2	320,0	6,3
Puglia	5,0	73	112,9	352,0	350,0	6,0
Basilicata	5,5	73	113,3	346,0	336,0	7,2
Calabria	4,9	74	107,2	331,8	320,0	7,5
Sicilia	4,9	73	106,6	342,5	340,0	7,8
Sardegna	5,1	74	104,3	348,7	345,0	7,5
Italia	4,6	74	104,0	335,9	330,0	7,0
Nord	4,2	75	100,7	333,4	320,0	6,5
Centro	4,9	74	104,8	338,3	330,0	7,9
Sud e Isole	5,0	73	107,3	337,5	330,0	7,0

Tabella 3.10.1.s2 Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci per i disturbi genito-urinari nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Bassa aderenza*																
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23			
	Totale N=100.036							Nord N=41.074								
45-54 anni	13,9	12,4	12,8	13,4	13,1	-3		12,1	11,1	11,1	11,3	11,4	1			
55-64 anni	10,5	9,9	9,7	9,4	9,1	-3		9,4	8,8	8,7	8,6	8,2	-5			
65-74 anni	9,4	9,3	8,9	8,7	8,6	-1		8,9	8,4	7,6	7,5	7,6	2			
75-84 anni	10,3	10,1	10,1	9,0	9,2	3		9,2	9,0	8,7	8,0	8,0	0			
≥85 anni	11,0	10,7	10,9	9,7	10,6	10		9,8	9,7	8,5	8,3	9,3	13			
Totale	10,3	10,0	9,8	9,3	9,4	1		9,3	8,9	8,5	8,2	8,2	0			
	Centro N=20.804							Sud N=38.158								
45-54 anni	12,9	12,1	11,8	12,3	12,1	-2		15,7	13,6	14,8	15,7	15,0	-4			
55-64 anni	10,4	9,5	9,5	8,2	8,6	5		11,6	11,3	10,7	10,8	10,3	-4			
65-74 anni	9,1	8,7	8,9	9,0	7,8	-13		10,2	10,6	10,3	9,8	10,0	3			
75-84 anni	10,7	10,7	10,7	9,4	9,8	4		11,5	11,5	11,7	10,1	10,5	4			
≥85 anni	12,4	11,0	13,3	8,7	10,5	21		11,8	12,2	12,7	12,6	12,7	1			
Totale	10,3	9,8	9,9	9,1	9,0	-1		11,4	11,4	11,3	10,8	10,8	0			
segue																

segue

Tabella 3.10.1.s2 - continua

Alta aderenza*														
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23		2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	
	Totale N=100.036							Nord N=41.074						
45-54 anni	58,2	60,9	59,3	59,6	60,4	1		58,0	61,6	58,8	59,5	60,9	2	
55-64 anni	62,9	64,6	64,7	65,3	65,6	1		63,9	65,0	64,9	65,5	66,0	1	
65-74 anni	64,4	64,8	64,8	66,5	66,4	0		64,8	65,3	65,5	67,3	67,0	0	
75-84 anni	62,3	62,6	61,7	63,8	64,0	0		63,5	63,9	63,0	65,0	65,5	1	
≥85 anni	60,0	60,5	60,7	62,2	61,8	-1		61,6	61,9	63,3	63,8	63,8	0	
Totale	62,8	63,7	63,4	64,8	64,9	0		63,6	64,4	64,1	65,5	65,8	0	
	Centro N=20.804							Sud N=38.158						
45-54 anni	60,8	61,8	61,8	61,3	61,7	1		57,0	59,9	58,4	58,8	59,3	1	
55-64 anni	62,3	65,7	64,8	66,5	67,1	1		62,3	63,7	64,4	64,3	64,5	0	
65-74 anni	65,0	65,6	65,5	66,9	67,1	0		63,7	63,8	63,8	65,5	65,4	0	
75-84 anni	61,7	61,9	61,4	62,5	63,5	2		61,0	61,0	60,2	62,8	62,2	-1	
≥85 anni	58,9	59,7	56,7	61,1	60,7	-1		58,6	59,1	59,8	60,4	59,8	-1	
Totale	62,8	64,2	63,6	65,0	65,4	1		61,9	62,7	62,6	63,8	63,7	0	

* L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40% del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).

N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2023-31/12/2023, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2023. Percentuali dei soggetti con bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata. Tempo mediano (IQR) di follow-up: 323 (239-346).

Tabella 3.10.1.s3 Persistenza a un anno al trattamento con farmaci per i disturbi genito-urinari nella popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2020-2024 e variazione 2024-2023

Persistenza a 12 mesi												
	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23	2020	2021	2022	2023	2024	Δ % 24-23
	Totale N=100.036						Nord N=41.074					
45-54 anni	41,5	44,2	43,9	44,6	44,2	-1	42,7	46,0	44,7	45,4	44,5	-2
55-64 anni	49,0	51,0	51,1	52,6	54,0	3	50,8	52,4	51,9	53,6	55,0	3
65-74 anni	51,6	52,1	52,4	54,9	55,3	1	52,8	53,0	53,3	56,0	55,9	0
75-84 anni	50,9	51,4	50,6	52,9	53,5	1	52,7	53,0	52,1	54,1	54,9	1
≥85 anni	49,6	49,0	51,5	51,7	52,3	1	51,0	51,1	54,3	54,4	54,0	-1
Totale	49,9	50,7	50,8	52,9	53,5	1	51,6	52,2	52,0	54,1	54,5	1
	Centro N=20.804						Sud N=38.158					
45-54 anni	41,8	44,3	46,3	47,3	46,5	-2	40,5	42,6	42,1	42,6	42,8	0
55-64 anni	48,3	51,8	51,6	54,1	55,4	2	47,5	49,2	50,0	50,9	52,2	3
65-74 anni	52,2	52,5	53,0	55,1	55,7	1	50,1	50,8	51,1	53,6	54,4	2
75-84 anni	50,3	51,3	49,8	52,4	53,0	1	48,8	49,1	49,0	51,7	52,2	1
≥85 anni	48,5	49,0	47,9	50,3	52,1	4	47,4	45,9	49,9	48,4	49,9	3
Totale	49,8	51,0	51,0	53,3	54,0	1	48,2	48,9	49,4	51,2	52,1	2

La persistenza al trattamento è stata valutata solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione erogata entro 60 gg (per maggiori dettagli consultare i metodi statistici)

3.11.1.1 FARMACI PER I DISTURBI OCULARI

Tabella 3.11.1.1.s1 Esposizione e durata di terapia di farmaci per i disturbi oculari per Regione in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione per conto (anno 2024)

Regione	Prevalenza d'uso (%)			Età mediana	Costo per utilizzatore	DDD per utilizzatore	DDD mediana	Utilizzatori con 1 prescrizione (%)
	maschi	femmine	totale					
Piemonte	2,4	2,8	2,6	75	169,0	356,1	300,0	5,0
Valle d'Aosta	2,0	2,4	2,2	76	160,9	333,9	300,0	4,5
Lombardia	1,6	1,8	1,7	75	177,3	359,8	300,0	3,8
PA Bolzano	1,3	1,6	1,5	76	171,6	378,2	300,0	3,7
PA Trento	1,5	1,6	1,5	75	185,9	390,0	300,0	6,1
Veneto	1,8	2,0	1,9	75	177,2	378,8	305,0	4,1
Friuli VG	2,2	2,5	2,4	77	184,5	387,1	325,0	3,6
Liguria	2,2	2,5	2,4	77	187,2	360,3	300,0	4,8
Emilia R.	2,6	3,0	2,8	76	172,9	367,3	300,0	4,4
Toscana	2,7	3,1	2,9	77	169,4	352,5	300,0	6,4
Umbria	2,5	2,7	2,6	77	184,5	376,7	325,0	5,8
Marche	3,0	3,4	3,2	76	177,5	380,1	325,0	6,4
Lazio	2,2	2,4	2,3	75	169,5	350,3	300,0	7,2
Abruzzo	2,7	2,9	2,8	75	157,6	329,9	300,0	9,8
Molise	2,0	2,0	2,0	74	152,1	298,5	250,0	8,4
Campania	1,9	2,3	2,1	72	157,9	317,2	270,0	8,4
Puglia	2,2	2,4	2,3	73	150,6	319,0	270,0	9,7
Basilicata	2,5	2,8	2,6	73	157,2	326,3	275,0	10,0
Calabria	2,1	2,5	2,3	74	152,5	315,1	270,0	9,7
Sicilia	1,9	2,1	2,0	74	155,1	326,1	275,0	9,0
Sardegna	2,0	2,0	2,0	75	183,1	389,8	325,0	5,8
Italia	2,1	2,4	2,2	75	168,7	350,7	300,0	6,4
Nord	2,0	2,3	2,1	76	175,7	365,7	300,0	4,3
Centro	2,5	2,8	2,6	76	171,8	357,6	300,0	6,7
Sud e Isole	2,1	2,3	2,2	73	157,0	325,8	275,0	8,9