

## SCHEDA PAZIENTE

XENPOZYME (olipudas! alfa)

Questa Scheda Paziente contiene informazioni importanti delle quali è opportuno essere a conoscenza quando si viene trattati con XENPOZYME. Fare riferimento al foglio illustrativo per informazioni complete.



## Linee guida generali

Mostrì questa scheda a qualsiasi  
medico o infermiere coinvolto nelle  
Sue cure mediche.

**XENPOZYME**  
(olipudasi alfa)

Nome e cognome del/la paziente:

Medico &gt;prescrivente/curante&gt;:

Nome:

- Contatto (telefono):

Ospedale/Centro:

Nome:

- Contatto di emergenza (telefono):

## Effetti indesiderati

XENPOZYME viene somministrato mediante infusione endovenosa. In rari casi, durante o dopo l'infusione, i pazienti possono manifestare una reazione allergica grave, che deve essere trattata immediatamente.

Richiedi assistenza medica urgente in caso di comparsa o peggioramento di uno qualsiasi dei seguenti segni e sintomi durante o dopo l'infusione:

- Respiro affannoso/soffocamento
- Capogiri, debolezza o svenimento
- Debolezza e pulsazioni accelerate
- Nausea, vomito o diarrea
- Pelle arrossata e pallida, eruzione cutanea, prurito

La preghiamo di segnalare eventuali eventi al Suo medico prescrivente/curante.

## Cos'è XENPOZYME?

XENPOZYME è un farmaco che contiene un enzima artificiale o lipudasi alfa come principio attivo.

Viene utilizzato in sostituzione di un enzima chiamato sfingomielinasi acida (Acid sphingomyelinase, ASM), che manca nei pazienti con deficit di ASM (ASMD). In questi pazienti, l'attività dell'enzima ASM è inferiore al normale o del tutto assente, il che può causare vari sintomi.

XENPOZYME è indicato in pazienti pediatrici e adulti, come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche, non centrali del deficit di sfingomielinasi acida (ASMD) di tipo A/B o B.

stingomielinasi acida (ASMD) di tipo A/B o B.

## Per le donne in età fertile, comprese le adolescenti

Si raccomanda di eseguire un test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento.

Si consiglia di utilizzare efficaci metodi contraccettivi durante il trattamento e, nel caso in cui olipudasi alfa venisse interrotto, per 14 giorni dopo l'ultima dose.


Discuta della necessità di efficaci metodi di contraccezione con il Suo medico prescrivente/curante.

Contatti il Suo medico prescrivente/curante se sospetta di poter essere incinta o se sta pianificando una gravidanza o l'allattamento.

## SCHEDA PAZIENTE

### XENPOZYME (olipudasi alfa)

Questa Scheda Paziente contiene informazioni importanti delle quali è opportuno essere a conoscenza quando si viene trattati con XENPOZYME. Fare riferimento al foglio illustrativo per informazioni complete.



### Linee guida generali

Mostri questa scheda a qualsiasi medico o infermiere coinvolto nelle Sue cure mediche.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR.

**XENPOZYME**  
(olipudasi alfa)

Nome e cognome del/la paziente: \_\_\_\_\_

Medico <prescrivente/curante>: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Contatto (telefono): \_\_\_\_\_

Ospedale/Centro: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Contatto di emergenza (telefono): \_\_\_\_\_

## Effetti indesiderati

XENPOZYME viene somministrato mediante infusione endovenosa. In rari casi, durante o dopo l'infusione, i pazienti possono manifestare una reazione allergica grave, che deve essere trattata immediatamente.

Richieda assistenza medica urgente in caso di comparsa o peggioramento di uno qualsiasi dei seguenti segni e sintomi durante o dopo l'infusione:

- Respiro affannoso/soffocamento
- Capogiri, debolezza o svenimento
- Debolezza e pulsazioni accelerate
- Nausea, vomito o diarrea
- Pelle arrossata e pallida, eruzione cutanea, prurito

La preghiamo di segnalare eventuali eventi al Suo medico prescrivente/curante.

## Cos'è XENPOZYME?

### Per le donne in età fertile, comprese le adolescenti

Si raccomanda di eseguire un test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento.

Si consiglia di utilizzare efficaci metodi contraccettivi durante il trattamento e, nel caso in cui olipudasi alfa venisse interrotto, per 14 giorni dopo l'ultima dose.

Discuta della necessità di efficaci metodi di contraccezione con il Suo medico prescrivente/curante.

Contatti il Suo medico prescrivente/curante se sospetta di poter essere incinta o se sta pianificando una gravidanza o l'allattamento.

XENPOZYME è un farmaco che contiene un enzima artificiale olipudasi alfa come principio attivo.

Viene utilizzato in sostituzione di un enzima chiamato sfingomielinasi acida (Acid Sphingomyelinase, ASM), che manca nei pazienti con deficit di ASM (ASMD). In questi pazienti, l'attività dell'enzima ASM è inferiore al normale o del tutto assente, il che può causare vari sintomi.

XENPOZYME è indicato in pazienti pediatrici e adulti, come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche, non centrali del deficit di sfingomielinasi acida (ASMD) di tipo A/B o B.