E	*Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità*	**Scheda di monitoraggio semplificato multifarmaco anti-VEGF intravitreali**
O	*Campo obbligatorio*	

1- Scheda Registrazione paziente (RP)		
O	Età	…

2- Scheda Eleggibilità e Dati Clinici (E_DC)					
Al fine di prescrivere i medicinali intravitreali anti-VEGF attraverso la scheda multifarmaco semplificata, il medico deve prendere atto di quanto riportato nei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto dei medicinali, nella Nota AIFA 98 (G.U. Serie generale n.323 del 31/12/2020) e nel documento di appropriatezza che è parte integrante della nota stessa. Si ricorda agli utenti che, in caso di trattamenti iniziati nei corrispondenti registri AIFA e migrati nel monitoraggio semplificato, è obbligatorio chiudere il trattamento precedente selezionando come CAUSA DI FINE TRATTAMENTO "Chiusura del monitoraggio per passaggio a scheda multifarmaco semplificata					
E	Indicazione	Degenerazione maculare correlata all'età (AMD) Edema maculare diabetico (DME) Compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroideale (CNV) Edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale) Preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo) **Retinopatia del prematuro (ROP)**	Combobox		

		Abevmy	Combobox	**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR** **3 - Preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)**	
		Afqlir		**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	
		Alymsys		**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR** **3 - Preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)**	
		Avastin		Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR 3 - **Preparazione** alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)	
		Baiama		**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	Selezionabile dalla data che verrà indicata
		Beovu		Selezionabile per le indicazioni: **1 - wAMD** **2 - DME**	
		Byooviz		Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME 3 - CNV 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	

E	Medicinale	Eylea	Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** 3 - **CNV mp** 4 - **RVO (RVO di branca o RVO centrale)** **5 - ROP**	**ROP disponibile a partire dalla data di pubblicazione in G.U.**
		Eiyzey	**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	
		Eydenzelt	**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	Selezionabile dalla data che verrà indicata
		Lucentis	Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** 3 - **CNV** 4 - **RVO (RVO di branca o RVO centrale)** **5 - ROP**	
		Mvasi	Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR 3 - **Preparazione** alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)	
		Mynzepli	**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	
		Oyavas	Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR 3 - **Preparazione** alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)	

Opuviz	**Selezionabile per le indicazioni:** **1 - wAMD** **2 - DME** **3 - CNV mp** **4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)**	Selezionabile dalla data che verrà indicata
Ranluspec	Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME 3 - CNV 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	
Ranivisio	Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME 3 - CNV 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	
Rimmyrah	Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME 3 - CNV 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	
Vabysmo	Selezionabile per le indicazioni: 1 - **wAMD** 2 - **DME** 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	
Vegzelma	Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME - BCVA migliore o uguale 0.3 logMAR 3 - Preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante (emovitreo e/o distacco trattivo)	
Ximluci	Selezionabile per le indicazioni: 1 - wAMD 2 - DME 3 - CNV 4 - RVO (RVO di branca o RVO centrale)	

E	Localizzazione	Zona I	Combobox	Se selezionate Zona I o II apre la domanda "Stadiazione"	La domanda si apre se selezionate ROP e Lucentis OPPURE ROP e EYLEA
		Zona II			
		Zona III		Blocco	
		Aggressive Posterior ROP			
E	Stadiazione	Stadio 1+	Combobox	LUCENTIS : Nessun blocco se selezionata "Zona I"; Se selezionato "Zona II", blocca per Stadio 1+, 2+ oppure 3 **EYLEA : Se selezionata "Zona I" nella domanda "Zona" nessun blocco.** **Se selezionata "Zona II" nella domanda "Zona" blocca 1+, e 3**	La domanda compare solo se selezionato "Zona I o II"
		Stadio 2+			
		Stadio 3			
		Stadio 3+			
E	CNV attiva secondaria a MP	Si	Combobox		La domanda compare solo se selezionato "compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroideale (CNV)" AND "Eylea" OR "Afqlir" OR "Mynzepli" OR "Eiyzey" OR "Baiama" OR "Opuviz" OR "Byooviz" OR "Ranluspec"nelle domande "Indicazione" e "Medicinale "
		No		**Blocco**	

E	Acuità visiva con migliore correzione migliore o uguale a 0.3 LOG MAR (5/10)	Si No	*Combobox*	**Blocco**	La domanda compare solo se selezionato "Edema maculare diabetico" AND "Avastin" OR "Abevmy" OR "Alymsys" OR "Mvasi" OR "Oyavas" OR "Vegzelma" nelle domande "Indicazione" e "Medicinale "
O	Occhio	Destro Sinistro	*Combobox*	*Non sono accettabili due trattamenti aperti sullo stesso occhio.*	**Controllo sulla coppia CODICE_PAZIENTE - OCCHIO. Non sono accettabili 2 o più trattamenti con la stessa coppia "codice paziente - occhio" (e.g. stesso codice paziente, 2 occhi destri o 2 occhi sinistri). Stesso funzionamento dei registri IVT**
O	Il paziente è in trattamento con lo stesso medicinale e per la stessa patologia/occhio e monitorato attraverso registro AIFA	Si No	*Combobox*		

E	E’ stata compilata la scheda di Fine Trattamento, prima dell’inserimento della presente scheda multifarmaco?	Si	*Combobox*		
		No		**blocca**	**messaggio errore: Non è possibile salvare la scheda, si ricorda che è obbligatorio chiudere il trattamento precedente selezionando come CAUSA DI FINE TRATTAMENTO “Chiusura del monitoraggio per passaggio a scheda multifarmaco semplificata"**
O	Data inizio trattamento all’interno del precedente registro di monitoraggio	../../..	*campo data*		
O	Numero di somministrazioni ricevute all’interno del precedente registro di monitoraggio		*testo libero*	campo numerico intero	
3- Scheda Richiesta (RF) per occhio					
O	Data richiesta farmaco	../../…			
		1.25 mg	*Combobox*	precompilato per Abevmy (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		1.25 mg		precompilato per Alymsys (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		1.25 mg		precompilato per Avastin (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		6 mg		precompilato per Beovu (ciclo 28 giorni)	

O	Posologia	2 mg		**precompilato per Eylea TUTTE LE INDICAZIONI ECCETTO ROP (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)** **precompilato per Afqlir (ciclo 30gg)** **precompilato per Mynzepli (ciclo 30gg)** **precompilato per Eiyzey (ciclo 30 gg)** **precompilato per Baiama (ciclo 30 gg)** **precompilato per Opuviz (ciclo 30 gg)** **precompilato per Byooviz (ciclo 30 gg)** **precompilato per Ranluspec (ciclo 30 gg)**	
		8 mg		posologia Eylea (solo indicazioni wAMD, DME)	
		0.4 mg		precompilato per Eylea SOLO ROP (ciclo 28 gg non deve comparire come dicitura)	
		0.5 mg		precompilato per Lucentis o Ranivisio - TUTTE LE INDICAZIONI TRANNE ROP (ciclo 28 gg non deve comparire come dicitura)	
		0.2 mg		precompilato per Lucentis - SOLO ROP (ciclo 28 gg non deve comparire come dicitura)	
		1.25 mg		precompilato per Mvasi (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		1.25 mg		precompilato per Oyavas (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		6 mg		precompilato per Vabysmo (ciclo 28 gg non deve comparire come dicitura)	
		1.25 mg		precompilato per Vegzelma (ciclo 30 gg non deve comparire come dicitura)	
		0.5 mg		precompilato per Ximluci e per Rimmyrah	
O	Dose totale	…	***uguale alla posologia selezionata***		
O	Dose die calcolata secondo la posologia	…	***uguale alla posologia selezionata***		

O	Si sono verificate reazioni nocive e inattese al medicinale	Si	*Combobox*	*successiva alla RF1. Link alla RNFV*	
		No			

4- Scheda Rivalutazione (RV)					
Nessuna RIV obbligatoria					
O	Data di Rivalutazione	../../….			
O	Il paziente ha avuto una reazione nociva e non voluta al medicinale nel ciclo precedente?	Si	*Combobox*	*Link alla RNFV*	
		No			
E	Il paziente prosegue il trattamento?	Si	*Combobox*		
		No		***blocco** ; porta alla scheda FT*	
5- Scheda Fine Trattamento (FT)					
O	Causa del Fine Trattamento	Inefficacia	*Combobox*		
		Fine regolare del trattamento			
		Tossicità		*Link alla RNFV*	
		Perdita al follow up			
		Decisione Clinica			
		Decisione Paziente			
		Causa non dipendente dal farmaco			
		Decesso			
O	**Causa del decesso**	**Malattia**	**campi da visualizzare e da compilare se "Causa FT =**		
		Tossicità al medicinale			
		Altro			
O	**Data del decesso**	**../../….**		**controllo standard data decesso**	
O	Data di Fine Trattamento	…			
O	Numero di somministrazioni ricevute		in automatico conta da DF. Se in EDC paziente risposto SI a "già in trattamento" → calcola sommando anche le somministrazioni precedenti indicate in EDC		