

## Checklist per le azioni da eseguire prima di prescrivere / dispensare o somministrare Strattera

Identificativo Paziente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Un medico specialista nel trattamento dell'ADHD ha effettuato la diagnosi iniziale per il paziente secondo i criteri stabiliti dal DSM o dalle linee guida dell'ICD.

E' stata eseguita una anamnesi medica accurata, comprendente:

- I farmaci assunti contemporaneamente: \_\_\_\_\_

*Nota che atomoxetina deve essere usata con cautela insieme a farmaci antiipertensivi e ad agenti o farmaci che possono aumentare la pressione sanguigna (come il salbutamolo)*

- Storia familiare: \_\_\_\_\_

*Nota che una storia familiare di morte cardiaca improvvisa/non spiegata o una aritmia maligna è un fattore di rischio per eventi cardiovascolari*

- Patologie o sintomi in comorbidità avuti in passato e attualmente presenti: \_\_\_\_\_

E' stato eseguito un esame fisico

Note: \_\_\_\_\_

E' stata eseguita una valutazione iniziale della situazione cardiovascolare del paziente, che include la pressione del sangue e la frequenza cardiaca

*(Per i bambini, si raccomanda di registrare queste misurazioni su un grafico percentile e, se un grafico percentile non è disponibile di registrarle nella tabella allegata.)*

La valutazione mostra l'assenza di una grave malattia cardiovascolare o cerebrovascolare che sarebbe destinata a peggiorare se il paziente avesse aumenti clinicamente importanti della pressione sanguigna o della frequenza cardiaca (come ad esempio un aumento della pressione sanguigna di 15-20 mmHg o un aumento della frequenza cardiaca di 20 battiti al minuto).

- *Alcuni esempi di pazienti che sarebbero destinati ad avere un peggioramento critico della loro condizione preesistente includerebbero quelli con le seguenti condizioni: Gravi malattie cardiovascolari includono grave ipertensione, insufficienza cardiaca, patologia arteriosa occlusiva, angina, cardiopatia congenita emodinamicamente significativa, cardiomiopatie, infarto del miocardio, aritmie potenzialmente mortali e patologie a carico dei canali (malattie causate da una disfunzione dei canali ionici), aneurisma cerebrale o ictus.*

*Selezionare una  
casella*

I dati iniziali ottenuti dalla anamnesi del paziente e dall'esame fisico non suggeriscono la presenza di una malattia cardiovascolare o cerebrovascolare

**OPPURE**

I dati iniziali ottenuti dalla anamnesi del paziente e dall'esame fisico suggeriscono la presenza di una malattia cardiovascolare o cerebrovascolare e un cardiologo ha consigliato che il trattamento con Strattera può essere iniziato sotto un attento monitoraggio.

**Tutte le sezioni della checklist devono essere verificate prima di andare avanti e iniziare il trattamento del paziente**

## Checklist per il monitoraggio della gestione dei rischi cardiovascolari associati al trattamento con Strattera

Identificativo paziente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Se sono passati 6 mesi dall'ultima valutazione del paziente o se il dosaggio è stato modificato, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca sono state misurate e registrate  
(Per i bambini, si raccomanda di registrare queste misurazioni su un grafico percentile e, se un grafico percentile non è disponibile, di registrarle nella tabella allegata.)

Note: \_\_\_\_\_

Il paziente NON ha sviluppato segni/sintomi di una nuova patologia cardiovascolare o il peggioramento di una malattia cardiovascolare preesistente

Selezionare una casella

**OPPURE**

Il paziente ha sviluppato segni/sintomi di una nuova patologia cardiovascolare o il peggioramento di una malattia cardiovascolare preesistente e dopo un'ulteriore valutazione un cardiologo ha consigliato che il trattamento con Strattera può essere continuato

Note \_\_\_\_\_

Il paziente NON ha sviluppato nuovi segni/sintomi neurologici

Selezionare una casella

**OPPURE**

Il paziente ha sviluppato nuovi segni/sintomi neurologici e uno specialista ha consigliato che il trattamento con Strattera può essere continuato

Note \_\_\_\_\_

Il paziente è stato in trattamento con atomoxetina per meno di 1 anno

Selezionare una casella

**OPPURE**

Il paziente è stato in trattamento con atomoxetina per più di 1 anno ed è stata effettuata una rivalutazione della necessità della terapia da parte di uno specialista nel trattamento dell'ADHD

Note \_\_\_\_\_

Tutte le sezioni della checklist devono essere verificate ad ogni visita durante il trattamento

