

ANTIBIOTICI? USALI SOLO QUANDO NECESSARIO

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse agli antibiotici

Il totale delle segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADRs) agli antibiotici inoltrate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza AIFA nel 2011 è stato di 2.581, pari al 12% della totalità delle segnalazioni registrate nella Rete per tutti i medicinali nello stesso anno e inferiori del 1,5% rispetto alle segnalazioni agli antibiotici registrate nell'anno precedente.

Le categorie per le quali si osservano maggiori segnalazioni sono le penicilline (1.159), in particolare le associazioni di penicilline inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi (827); gli antibiotici chinolonici (529 segnalazioni, di cui 522 con i fluorochinoloni); gli altri antibiotici betalattamici, con 497 segnalazioni di cui 374 attribuibili alle cefalosporine di III generazione.

Il maggior numero di reazioni gravi, pari a 576 e corrispondenti al 8,8% del totale delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi per tutti i medicinali, è stato riportato in seguito alla somministrazione di antibiotici beta-lattamici e penicilline. Seguono i chinolonici con 159 segnalazioni, pari al 2,4%, i macrolidi con 55 pari allo 0,8%, e le associazioni di sulfamidici con trimetoprim con 31 segnalazioni di ADR gravi, pari allo 0,47% del totale.

I decessi per sospette reazioni avverse da antibiotici sono stati 17.