

## Cosa devo sapere su Xarelto?

- ◆ Xarelto fluidifica il sangue, prevenendola dalla formazione di pericolosi coaguli.
- ◆ Xarelto deve essere preso esattamente secondo quanto prescritto dal medico. Per assicurare una protezione ottimale dai coaguli, **non saltare mai una dose.**
- ◆ Non deve mai smettere di prendere Xarelto senza parlarne prima col medico, perchè il rischio di formazione di coaguli può aumentare.

- ◆ Informi il personale sanitario se sta assumendo, ha recentemente assunto o ha intenzione di assumere qualsiasi altro medicinale, prima di prendere Xarelto.
- ◆ Informi il personale sanitario che sta assumendo Xarelto prima di ogni intervento chirurgico o procedura invasiva.

## Quando devo chiedere consiglio al personale sanitario?

Quando si prende un fluidificante del sangue come Xarelto è importante essere

informati sui possibili effetti indesiderati. Il sanguinamento rappresenta l'effetto indesiderato più comune. Non cominci a prendere Xarelto se sa di essere a rischio di insoliti sanguinamenti senza averne prima discusso col medico. Informi immediatamente il personale sanitario se ha segni o sintomi di sanguinamento come ad esempio i seguenti:

- ◆ dolore
- ◆ gonfiore o disagio
- ◆ mal di testa, capogiro o debolezza
- ◆ lividi insoliti, sanguinamento dal naso, dalle gengive o da tagli che impiegano molto tempo a smettere di sanguinare

- ◆ flusso mestruale o sanguinamento vaginale più intensi del solito
- ◆ sangue nelle urine che possono risultare rosa o marroni, feci rosse o nere
- ◆ tosse con sangue, o vomito con sangue o con materiale che sembra fondo di caffè

## Come prendo Xarelto®?

- ◆ Per assicurare una protezione ottimale, Xarelto
  - 2,5 mg può essere preso con o senza cibo
  - 10 mg può essere preso con o senza cibo
  - 15 mg dev'essere preso durante i pasti
  - 20 mg dev'essere preso durante i pasti

## Tessera per il Paziente



Xarelto® 2,5 mg ☐  
Xarelto® 10 mg ☐  
Xarelto® 15 mg ☐  
Xarelto® 20 mg ☐

- ◆ **Tenga sempre questa scheda con sè**
- ◆ **Mostri questa scheda ad ogni medico o dentista prima di un trattamento**

## Io sono in trattamento anticoagulante con Xarelto (rivaroxaban)

Nome: \_\_\_\_\_

Altri medicinali / condizioni: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

## In caso di emergenza informi per cortesia:

Nome del medico: \_\_\_\_\_

Telefono del medico: \_\_\_\_\_

Timbro del medico: \_\_\_\_\_

## Informi per cortesia anche:

Nome: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Tipo di relazione: \_\_\_\_\_

## Informazioni per il personale sanitario:

- ◆ I valori di INR non devono essere considerati perchè non sono un valore che dipende dall'attività anticoagulante di Xarelto.



Bayer