

Scheda di Allerta per il Paziente

Porti sempre con sé questa scheda
e la mostri al personale medico che vede

Informazioni importanti sulla sicurezza di Forxiga (dapagliflozin) – solo per diabete mellito di tipo 1

I segni di CAD includono:

Bocca e stomaco: sentirsi male o essere malati, mal di stomaco, sete eccessiva/secchezza delle fauci (segni di disidratazione), sapore dolce o metallico in bocca.

Respiro, respirazione e olfatto: respirazione accelerata e profonda, alito dolciastro, l'urina o il sudore hanno un odore differente.

Altri segni: livello aumentato di chetoni nell'urina o nel sangue, rapido calo ponderale, stato confusionale, sensazione insolita di sonnolenza o stanchezza.

Se manifesta segni/sintomi di CAD consulti un medico o si rechi immediatamente all'ospedale ed interrompa il trattamento con Forxiga.

Attenzione:

Nei pazienti in trattamento con Forxiga la CAD può insorgere anche se i valori della glicemia sono inferiori a 14 mmol/L (250 mg/dL). In questo caso si parla di 'CAD euglicemica'.

Informazioni per contattare Lei e il Suo medico



Nome:

Nome del medico:

Numero di telefono del medico:

Data di inizio del trattamento con Forxiga:

Parente o amico da contattare in caso
di emergenza:

Numero di telefono del parente o amico:

Informazioni per i medici, i farmacisti e gli infermieri



Questo paziente sta assumendo Forxiga (dapagliflozin) per il trattamento del diabete mellito di tipo 1.

- È impiegato in aggiunta all'insulina.
- È un tipo di 'inibitore di SGLT-2'.

Sospendere temporaneamente il trattamento con Forxiga prima di procedure chirurgiche o in caso di ricovero in ospedale per grave malattia in fase acuta.

Valutare immediatamente i pazienti per la chetoacidosi diabetica (CAD) in presenza di segni di CAD.

- Valutare la presenza di CAD a prescindere dal livello di glucosio nel sangue.
- Nei pazienti in trattamento con Forxiga la CAD può insorgere anche se i valori della glicemia sono inferiori a 14 mmol/L (250 mg/dL). In questo caso si parla di 'CAD euglicemica'.

Trattamento della CAD

- **In caso di sospetto di CAD:** fornire al paziente cure mediche immediate e interrompere immediatamente il trattamento con Forxiga.
- **Il trattamento di CAD euglicemica può richiedere:** quantità supplementare di carboidrati in aggiunta ad insulina e liquidi.

Non sospendere né interrompere il trattamento con insulina in nessun caso.

Questa scheda, la Guida per i pazienti e gli operatori assistenziali e il foglio illustrativo sono disponibili online al seguente indirizzo:
<http://pwa.ltd/frx-pat-it>

Versione 1 Giugno/2019

Materiale Educazionale approvato
da AIFA in data xx/xx/2019

Cod. IT000432

AstraZeneca 