

ALLEGATO 2

Fondo farmaci oncologici innovativi

| FARMACO | PRINCIPIO ATTIVO | INDICAZIONI | CLASSE | DATA EFFICACIA | DATA SCADENZA |
|------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|----------------------|
| PERJETA | pertuzumab | carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica | H | 08/07/2014 | 07/07/2017 |
| ABRAXANE | paclitaxel | trattamento di prima linea adenocarcinoma metastatico del pancreas | H | 21/02/2015 | 20/02/2018 |
| ZYDELIG | idelalisib | leucemia linfatica cronica (chronic lymphocytic leukaemia, CLL) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente , o come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in pazienti non idonei ad altre terapie linfoma follicolare (follicular lymphoma, FL) refrattario a due precedenti linee di trattamento | H | 11/09/2015 | 10/09/2018 |
| IMBRUVICA | ibrutinib | linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione del 17p o della mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata Imacroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata | H | 05/01/2016 | 04/01/2019 |
| OPDIVO | nivolumab | melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti | H | 25/03/2016 | 24/03/2019 |
| KEYTRUDA | pembrolizumab | melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumour proportion score (TPS) \geq 50 % in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS \geq 1 % e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere KEYTRUDA | H | 11/05/2016 | 10/05/2019 |