

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi uno studio danese, secondo cui bambini e adolescenti esposti al trattamento con antipsicotici hanno fatto registrare un aumento del rischio di diabete di tipo 2.

*Buona lettura,
Luca Pani*

3 settembre 2014

Rischio di diabete nei bambini e negli adolescenti esposti agli antipsicotici: uno studio danese

Uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ha concluso che i bambini e gli adolescenti a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico hanno riportato un aumento del rischio di sviluppare il diabete in caso di esposizione agli antipsicotici.

Utilizzando i dati dei registri a livello nazionale, un gruppo di ricercatori guidato da René Ernst Nielsen dell'Aalborg University Hospital in Danimarca, ha studiato 48.299 tra bambini e adolescenti affetti da disturbi psichiatrici, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 30 giugno 2010, per documentare la frequenza e i possibili predittori del diabete di tipo II (trattamento con un farmaco antidiabetico orale).

Vai sul sito AIFA per la notizia

originale

3 settembre 2014

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici di Medicina Generale, a cura della Direzione Generale.

Se non vuoi più ricevere il servizio scrivi una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" all'indirizzo: news@aifa.gov.it.

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA.